

Tabla 2. Aves de la Universidad Militar Nueva Granada en Cajicá.

Familia	Nombre científico	Nombre común
Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i> *	Pijije aliblanco (R)
Anatidae	<i>Anas discors</i>	Cerceta aliazul (R/M)
Anatidae	<i>Nomonyx dominicus</i>	Pato enmascarado (R)
Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato colorado (R)
Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Zampullín de pico grueso (R)
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete coroninegro (R)
Ardeidae	<i>Butorides striatus</i>	Garcita cuelligris (R)
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcilla bueyera (R)
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza real (R)
Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i>	Garceta azul (M)
Threskiornithidae	<i>Phimosus infuscatus</i>	Ibis caripelado (R)
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Gallinazo común (R)
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora (M)
Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Elanio coliblanco (R)
Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i>	Gavilán pajarero (R)
Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	Gavilán campestre (R)
Rallidae	<i>Porzana carolina</i>	Sora (M)
Rallidae	<i>Porphyriops melanops</i>	Polluela norteña (R)

Familia	Nombre científico	Nombre común
Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	Tingua de pico rojo (R)
Rallidae	<i>Porphyrio martinica</i>	Gallareta morada (R)
Rallidae	<i>Fulica americana columbiana</i>	Focha americana (R)
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Avefría sabanera/alcaraván (R)
Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Chorlito tildio (R/M)
Scolopacidae	<i>Gallinago nobilis</i>	Becacina noble (R)
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Andaríos maculado (M)
Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Andaríos solitario (M)
Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	Jacana sureña (R)
Columbidae	<i>Patagioenas fasciata</i>	Paloma collareja (R)
Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Paloma sabanera (R)
Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	Cuculillo piquiamarillo (M)
Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	Garrapatero mayor (R)
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Lchuza ratonera (R)
Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	Lchucita tropical (R)
Strigidae	<i>Pseudoscops clamator</i>	Búho listado (R)
Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	Añapero zumbón (M)
Trochilidae	<i>Colibri coruscans</i>	Orejivioleta vientriazul (R)
Picidae	<i>Picoides fumigatus</i>	Carpintero pardo (R)
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo americano (R)
Psittacidae	<i>Forpus conspicillatus</i>	Periquito de anteojos (R)
Furnariidae	<i>Synallaxis subpudica</i>	Colaespina cundiboyacense (R)
Tyrannidae	<i>Elaenia frantzii</i>	Elaenia montañera (R)
Tyrannidae	<i>Mecocerculus leucophrys</i>	Tiranuelo gorgiblanco (R)
Tyrannidae	<i>Serpophaga cinerea</i>	Mosquitero guardarríos (R)
Tyrannidae	<i>Contopus virens/sordidulus**</i>	Pibí boreal (M)
Tyrannidae	<i>Sayornis nigricans</i>	Febe negruzco (R)
Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Mosquitero petirrojo (R)
Tyrannidae	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	Dormilona chica (R)
Tyrannidae	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	Mosquero vientriazufrado (M)
Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tirano tropical (R)
Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	Tijereta sabanera (M)
Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Verderón ojirrojo (M)

Familia	Nombre científico	Nombre común
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina tijereta (M)
Hirundinidae	<i>Orochelidon murina</i>	Golondrina vientrigris (R)
Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Sotorrey cucarachero (R)
Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i>	Zorzal rojizo (M)
Turdidae	<i>Catharus ustulatus</i>	Zorzal de Swainson (M)
Turdidae	<i>Turdus fuscater</i>	Mirlo grande (R)
Mimidae	<i>Mimus gilvus</i>	Paraulata tropical (R)
Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo (R)
Thraupidae	<i>Conirostrum rufum</i>	Picocono rufo (R)
Thraupidae	<i>Diglossa humeralis</i>	Pinchaflor negro (R)
Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Pinzón azafranado (R)
Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	Pinzón sabanero (R)
Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Gorrión andino/Copetón (R)
Cardinalidae	<i>Piranga rubra</i>	Tángara veranera (M)
Cardinalidae	<i>Piranga olivacea</i>	Tángara escarlata (M)
Cardinalidae	<i>Pheucticus aureoventris</i>	Picogordo pechinegro (R)
Cardinalidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Picogruoso pechirroza (M)
Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Reinita acuática norteña (M)
Parulidae	<i>Leiothlypis peregrina</i>	Reinita verdilla (M)
Parulidae	<i>Setophaga fusca</i>	Reinita gorjinaranja (M)
Parulidae	<i>Setophaga castanea</i>	Reinita pechicastaña (M)
Parulidae	<i>Myiiothlypis nigrocristata</i>	Reinita coroninegra (R)
Parulidae	<i>Cardellina canadensis</i>	Reinita canadiense (M)
Icteridae	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Turpial lagunero (R)
Icteridae	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Tordo capuchidorado (R)
Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Chamón (R)
Icteridae	<i>Sturnella magna</i>	Pastorero común (R)
Fringillidae	<i>Sporagra spinescens</i>	Jilguero andino (R)
Fringillidae	<i>Astragalinus psaltria</i>	Jilguero menor (R)

* Posiblemente introducida. ** No se escuchó el canto para reconocer la especie.

Residente (R), migratoria (M), o residentes/migratorias (R/M), i.e., migratorias según la ABO (2000), pero observadas por más de seis meses o anidando en el campus Nueva Granada en Cajicá.