

Cuadro 4
Tendencia de la mortalidad según evitabilidad por sexo.
Análisis de Joinpoint para tasas ajustadas. Colombia. 1985-2002

Grupo de causas	Período	Tasa		b	Período	Tasa		b	Período	Tasa		b
		inicial	final			inicial	final			inicial	final	
Mortalidad general	1985-02	647.71	515.14	-7.80*								
En varones	1985-02	798.77	664.12	-7.92*								
En mujeres	1985-89	541.34	467.24	-18.52*	1990-02	461.30	390.08	-5.93*				
Mortalidad no evitable	1985-99	102.77	70.91	-2.28*	2000-02	70.69	70.26	-0.21				
En varones	1985-02	111.94	75.24	-2.16*								
En mujeres	1985-02	92.43	59.88	-1.91*								
Causas mal definidas	1985-89	38.77	25.13	-3.41*	1990-97	24.47	19.86	-0.66*	1998-00	16.10	8.57	-3.77*
En varones	1985-89	43.39	28.77	-3.65*	1990-97	28.19	24.13	-0.58*	1998-00	19.63	10.61	-4.51
En mujeres	1985-89	34.99	22.00	-3.25*	1990-97	21.30	16.41	-0.70*	1998-00	13.22	8.63	-3.19*
Otras causas no clasificadas												
En varones	1985-95	52.77	36.49	-1.63*	1996-02	39.48	57.38	2.98*				
En mujeres	1985-96	59.08	40.78	-1.66*	1997-99	47.19	60.02	6.41*	2000-02	60.41	61.20	0.39
Mortalidad evitable	1985-95	46.98	32.01	-1.50*	1996-02	34.74	51.11	2.73*				
En varones	1985-02	467.39	390.85	-4.50*								
En mujeres	1985-02	597.09	522.49	-4.38*								
Muertes evitables por	1985-02	349.53	273.38	-4.47*								
prevención												
En varones	1985-95	2.77	0.78	-0.19*	1996-02	0.79	0.81	-0.00				
En mujeres	1985-96	2.83	0.90	-0.17*	1997-02	0.91	0.92	-0.00				
Tétanos	1985-95	2.61	0.65	-0.19*	1996-02	0.65	0.70	-0.00				
En varones	1985-93	0.54	0.14	-0.05*	1994-02	0.13	0.09	-0.00				
En mujeres	1985-93	0.58	0.18	-0.05*	1994-02	0.18	0.13	-0.01				
Tos ferina	1985-93	0.49	0.09	-0.05*	1994-02	0.08	0.06	-0.00				
En varones	1985-92	0.34	0.05	-0.04*	1993-02	0.05	0.05	0.00				
En mujeres	1985-92	0.33	0.03	-0.04*	1993-02	0.03	0.05	0.00				
Infecciones de transmisión sexual (Sin SIDA)	1985-02	0.18	0.01	-0.01*								
En varones	1985-02	0.17	0.08	-0.01*								
En mujeres	1985-02	0.18	0.10	-0.01*								
Muertes Evitables por atención médica	1985-02	0.15	0.06	-0.01*								
En varones	1985-02	265.67	224.61	-2.42*								
En mujeres	1985-02	292.98	257.18	-2.11*								
Muertes cardiovasculares en mayores de 20 años	1985-02	244.06	199.76	-2.60*								
En varones	1985-02	156.01	127.21	-1.69*								
En mujeres	1985-02	178.82	150.23	-1.68*								
En mujeres	1985-02	136.86	108.57	-1.66*								
Cáncer de cuello del útero	1985-91	10.39	8.54	-0.39*	1992-96	8.83	9.99	0.29	1997-02	9.78	8.75	-0.21*
Cáncer de mama en mujeres	1985-02	7.28	9.19	0.11*								
Cáncer de próstata	1985-02	8.70	14.81	0.36*								
Muertes evitables por saneamiento	1985-89	15.39	8.61	-1.69*	1990-02	8.26	4.10	-0.35*				
En varones	1985-89	16.71	9.54	-1.79*	1990-02	9.16	4.54	-0.38*				
En mujeres	1985-89	14.05	7.73	-1.58*	1990-02	7.41	3.65	-0.31*				
Diarreas en menores de 5 años	1985-94	9.12	3.23	-0.65*	1995-02	3.13	2.39	-0.11				
En varones	1985-93	10.0	3.93	-0.76*	1994-02	3.77	2.47	-0.16*				
En mujeres	1985-94	8.39	2.86	-0.61*	1995-02	2.78	2.20	-0.08				
Muertes evitables por medidas mixtas	1985-02	186.48	162.24	-1.43*								
En varones	1985-92	265.89	299.13	4.75*	1993-97	290.73	257.10	-8.41*	1998-02	258.14	262.30	1.04
En mujeres	1985-02	92.11	70.19	-1.29*								
En mujeres	1985-92	39.31	80.33	5.86*	1993-97	75.01	53.77	-5.31*	1998-02	56.75	68.67	2.98*
Homicidios	1985-92	75.24	151.75	10.93*	1993-97	141.76	101.81	-9.99*	1998-02	107.22	128.85	5.41*
En varones	1985-92	5.01	11.86	0.98*	1993-97	11.07	7.89	-0.79*	1998-02	8.46	10.73	0.57*
En mujeres	1985-94	0.02	0.05	0.00	1995-02	0.09	0.38	0.04*				
Dengue	1985-92	0.04	0.00	-0.00	1993-02	0.05	0.44	0.04*				
En varones	1985-02	-0.04	0.18	0.01*								
En mujeres												
Malaria	1985-95	1.10	0.22	-0.09*	1996-02	0.25	0.41	0.03				
En varones	1985-94	1.42	0.31	-0.12*	1995-02	0.33	0.46	0.02				
En mujeres	1985-94	0.87	0.22	-0.07*	1995-02	0.22	0.26	0.01				
Desnutrición	1985-94	3.75	2.51	-0.14*	1995-99	3.11	5.48	0.59*	1999-02	5.23	4.71	-0.26
En varones	1985-94	4.14	2.78	-0.15	1995-99	3.48	6.27	0.70*	1999-02	5.90	5.16	-0.37
En mujeres	1985-94	3.40	2.26	-0.13*	1995-99	2.77	4.81	0.51*	1999-02	4.67	4.38	-0.14

Cuadro 4
Tendencia de la mortalidad según evitabilidad por sexo.
Análisis de *joinpoint* para tasas ajustadas. Colombia. 1985-2002 (continuación)

Grupo de causas	Período	Tasa		b	Período	Tasa		b	Período	Tasa		b
		inicial	final			inicial	final			inicial	final	
Desnutrición en menores de 5 años	1985-94	0.80	0.55	-0.14*	1995-02	0.73	1.97	0.18*				
En varones	1985-94	1.87	0.56	-0.15*	1995-02	0.75	2.04	0.18*				
En mujeres	1985-94	1.68	0.52	-0.13*	1995-02	0.69	1.90	0.17*				
Respiratorias en menores de 5 años	1985-93	8.01	4.34	-0.46*	1994-02	4.24	3.43	-0.10*				
En varones	1985-93	8.40	4.64	-0.47*	1994-02	4.53	3.65	-0.11*				
En mujeres	1985-93	7.54	4.03	-0.44*	1994-02	3.94	3.20	-0.09*				
Tuberculosis	1985-91	8.59	4.68	-0.65*	1992-02	4.57	3.45	-0.11*				
En varones	1985-90	12.31	7.06	-1.05*	1991-01	6.89	5.09	-0.16*				
En mujeres	1985-91	5.72	2.94	-0.46*	1992-01	2.86	2.09	-0.08*				
Obstétricas	1985-96	3.73	1.78	-0.18*	1997-00	2.15	3.24	0.36*	2001-02	2.73	2.23	-0.50
Perinatales	1985-97	17.85	11.81	-0.50*	1998-00	13.74	17.60	1.93*	2001-02	15.02	12.44	-2.58*
En varones	1985-97	20.33	13.82	-0.54*	1998-00	15.85	19.90	2.03	2001-02	17.04	14.17	-2.86*
En mujeres	1985-97	15.23	9.78	-0.45*	1998-00	11.60	15.24	1.82*	2001-02	12.91	10.58	-2.33*

Tasas por cien mil b: variación anual de la tasa en muertes por 100 mil. * Variación significativamente diferente de cero (p<0.05)