

MACROHONGOS DE COLOMBIA II. LISTADO DE ESPECIES DE LOS ÓRDENES AGARICALES, BOLETALES, CANTHARELLALES Y RUSSULALES (AGARICOMYCETES, BASIDIOMYCOTA)

MACROFUNGI OF COLOMBIA II. CHECKLIST OF THE SPECIES OF AGARICALES, BOLETALES,
CANTHARELLALES, AND RUSSULALES (AGARICOMYCETES, BASIDIOMYCOTA)

Ana E. Franco-Molano^{1, 3}, Adriana Corrales^{2, 4}, Aída M. Vasco-Palacios^{2, 5}

Resumen

En Colombia, durante los últimos cincuenta años se ha incrementado el interés por el estudio de los macrohongos, siendo los bosques montanos los sitios mejor muestreados y por lo tanto mejor representados por un número mayor de géneros y especies. Para el país, actualmente se encuentran registradas en la literatura un total de 605 especies de macrohongos de los órdenes: Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales (Basidiomycota). En este nuevo listado, que es una continuación del trabajo publicado por Franco-Molano y Uribe-Calle en el año 2000, se incluyen 175 especies en 73 géneros: 151 especies del orden Agaricales, 14 de Boletales, 9 de Russulales y una de Cantharellales. 31 especies constituyen nuevos registros para el país.

Palabras clave: Colombia, diversidad, listado taxonómico, macrohongos, nuevos registros

Abstract

Interest in the study of macrofungi has increased in Colombia during the past 50 years. Mountain forests have been the sites better explored, from the mycological point of view, providing the largest number of genera and species. So far, the country's literature reports 605 macrofungi species belonging to the Agaricales, Boletales, Cantharellales, and Russulales orders (Basidiomycota). This new list, which is a continuation of work carried out by Franco Molano and Uribe-Calle in the year 2000, includes 175 species, distributed into 73 genera: 151 belonging to Agaricales, 14 to Boletales, 9 to Russulales, and only one to Cantharellales. 31 species constitute new records for the country.

Key words: Colombia, macrofungi diversity, new records, taxonomic checklist

INTRODUCCIÓN

En Colombia en los últimos cincuenta años se ha incrementado el interés por el estudio de la diversidad de macrohongos. La mayoría de trabajos que documentan esta diversidad, han sido realizados en bosques montanos dominados por

roble (*Quercus humboldtii* Bonpl.) o plantaciones de ciprés (*Cupressus lusitanica* Mill.) y de pino (*Pinus spp.*) y constituyen revisiones de grupos taxonómicos específicos o listados regionales en los que se han registrado 605 especies de macrohongos pertenecientes a los órdenes Agaricales (486 especies en 24 familias), Boletales (39 espe-

Recibido: agosto 2009; aceptado: mayo 2010.

¹ Docente. Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos. Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Antioquia. A. A. 1226, Medellín (Antioquia), Colombia.

² Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos. Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Antioquia. A. A. 1226, Medellín (Antioquia), Colombia.

Correos electrónicos: ³ <afranco@quimbaya.udea.edu.co>; ⁴ <acorral0@unalmed.edu.co>; ⁵ <avascop@yahoo.com>.

cies en 6 familias), Cantharellales (20 especies en 4 familias) y Russulales (60 especies en 8 familias) (Betancur et al. 2007, Franco-Molano y Uribe-Calle 2000, Franco-Molano et al. 2000, Guzmán y Varela 1978, Halling 1989, Halling et al. 1999, Halling y Mueller 2005, Horak y Halling 1991, López-Quintero et al. 2007, Mueller 1996, Mueller y Singer 1988, Petersen y Mueller 1992, Pineda et al. 1988, Pulido 1983, Pulido y Boekhout 1989, Saldaña et al. 1988, Singer et al. 1990, Tulloss et al. 1992).

La mayoría de registros (aproximadamente 83% de las especies) corresponden a la región Andina, mostrando que los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y aquellos que hacen parte del Parque Nacional Natural Los Nevados son los más muestreados. Las regiones de la Amazonia y el Caribe, con 13 y 6% de las especies, respectivamente (tabla 1) y el Chocó Biogeográfico con 7% de las especies, caracterizadas por la alta diversidad de flora y fauna, han sido muy pobremente exploradas desde el punto de vista micológico. Los Llanos Orientales con 1% de las especies, es la región con menos registros (Franco-Molano 1993, Franco-Molano et al. 2000, Franco-Molano y Uribe-Calle 2000, Franco-Molano y López-Quintero 2007, Franco-Molano et al. 2005, Guzmán et al. 2004, Pulido 1983, Torres y Hurtado 2003, Tulloss y Franco-Molano 2008).

Este nuevo listado es un aporte al conocimiento de los macrohongos registrados para Colombia y una continuación del trabajo publicado por Franco-Molano y Uribe-Calle (2000). Se incluyen 175 especies pertenecientes a los órdenes Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales que corresponden a material depositado en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA), el Herbario Nacional Colombiano (COL) y el Herbario del Jardín Botánico de New York (NY). Las colecciones que representan las especies citadas se realizaron durante el desarrollo de inventarios, proyectos y expediciones por algunos especialistas nacionales e internacionales en diferentes regiones del país. También se incluye información, existente en la literatura, no incluida por Franco-Molano y Uribe-Calle (2000) (Aldana-Gómez y Franco-Molano 2001, Baroni et al. 2007, Cardona et al. 2005, Corrales y López-Q. 2005, Franco-Molano 1993, Franco-Molano y López-Q. 2007, Franco-Molano et al. 2000, Guzmán et al. 1994, 2007, Halling 1989, Halling y Mueller 2005, Pineda et al. 1988, Pulido 1983, Pulido y Boekhout 1989, Singer 1974, Singer et al. 1990, Vasco-P. et al. 2005). El propósito del presente listado es facilitar la búsqueda de información básica sobre la diversidad de macrohongos, generar una línea base unificada sobre la cual se puedan ampliar los rangos de distribución de los géneros y especies, facilitar la inclusión de nuevos registros e identificar las regiones del país menos muestreadas.

Tabla 1. Número de especies de los órdenes Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales, registradas para las diferentes regiones de Colombia

Órdenes	Regiones				
	Amazonia	Andina	Caribe	Pacífico	Llanos
Agaricales	79	518	26	49	7
Boletales	4	43	0	3	1
Cantharellales	4	15	3	1	0
Russulales	1	50	8	1	0
Total	88	626	37	54	8

das para que sean incluidas en proyectos sobre diversidad de este grupo de organismos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente listado se realizó con base en la revisión parcial del material de los órdenes Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales recolectado en el país y depositado en el Herbario de la Universidad de Antioquia y en la revisión de bibliografía en las que se citan géneros y especies soportados con material del país (Aldana-Gómez y Franco-Molano 2001, Baroni et al. 2007, Betancur et al. 2007, Cardona et al. 2005, Corrales y López-Quintero 2005, Dennis 1970, Franco-Molano 1993, Franco-Molano et al. 2000, 2005, Franco-Molano y López-Quintero 2007, Franco-Molano y Uribe-Calle 2000, Guzmán y Varela 1978, Guzmán et al. 1994, 2004, 2007, Halling 1989, 1992, 1996, Halling y Mueller 2005, Halling et al. 1999, López-Quintero et al. 2007, Mata et al. 2001, Montoya et al. 2005, Mueller 1996, Muller y Wu 1997, Pegler 1983, Petersen y Muller 1992, Pineda et al. 1988, Pulido 1983, Pulido y Boekhout 1989, Saldarriaga et al. 1988, Singer 1974, 1976, 1982, 1986, Singer et al. 1983, 1990, Torres y Hurtado 2003, Tulloss y Franco-Molano 2008, Tulloss et al. 1992, Vasco-P. y Franco-Molano 2005, Vasco-P. et al. 2005, Velásquez et al. 1988).

Las 175 especies incluidas en este trabajo (anexo 1) están organizadas siguiendo el sistema de clasificación de órdenes y familias propuesto por el *Index Fungorum* (CABI Bioscience et al. 2008). Dentro de cada género, las especies se ordenaron alfabéticamente, indicando con un asterisco (*) los nuevos registros para Colombia. Se incluyen datos de distribución en el país utilizando las siguientes abreviaturas: **AMA** (Amazonas), **ANT** (Antioquia), **BOL** (Bolívar), **BOY** (Boyacá), **CAL** (Caldas), **CAQ** (Caquetá), **CAU** (Cauca), **CHO** (Chocó), **CUN** (Cundinamarca), **MAG** (Magdalena), **MET** (Meta), **NAR** (Nariño), **QUI** (Quindío),

RIS (Risaralda), **TOL** (Tolima), **VAL** (Valle del Cauca). Para cada una de las colecciones de referencia se incluye el nombre del colector, número de colección y herbario con su respectivo acrónimo según el *Index Herbariorum* donde se encuentran depositadas: Universidad de Antioquia (**HUA**), Herbario Nacional Colombiano (**COL**), Herbario del Instituto de Ecología, Xalapa (**XAL**), Herbario del New York Botanical Garden (**NY**), Herbario del Field Museum of Natural History, Chicago (**F**) (Holmgren y Holmgren 1998), indicando además si se trata de material tipo. Para las especies tomadas de literatura, se cita la publicación. Los nombres fueron actualizados según el *Index Fungorum* (2008) y en el anexo 2 se citan los sinónimos de las especies incluidas.

RESULTADOS

De las 175 especies incluidas en este listado, 151 corresponden al orden Agaricales, 14 a Boletales, 9 a Russulales y una a Cantharellales y se distribuyen en 15 familias y 73 géneros (anexo 1 y tabla 2). 31 especies constituyen nuevos registros para el país.

En el orden Agaricales, las familias Marasmiaceae (14 géneros y 48 especies), Tricholomataceae (18 géneros y 25 especies) y Mycenaceae (2 géneros y 22 especies) son las más diversas en cuanto al número de géneros y especies (tabla 2). En general para Colombia, los órdenes Agaricales (con 486 especies registradas), Poriales (con 193 especies registradas) y Boletales (con 39 especies registradas) han sido los más estudiados ya que la mayoría de micólogos que han visitado el país como Rolf Singer, Gastón Guzmán, Leif Ryvarden, Roy Halling, entre otros, trabajan con estos grupos de hongos y han dejado escuela al entrenar profesionales para su estudio. Se espera que a medida que se realicen inventarios, especialmente en las regiones menos estudiadas, se amplíen los rangos de distribución, se aumenten los registros y se describan nuevas especies.

Tabla 2. Número de géneros y especies por familias de los macrohongos de Colombia (**gén.** = géneros; **spp.** = especies)

Órdenes	Familias	# total de gén.	# total de spp.
Agaricales	Agaricaceae	6	12
	Bolbitiaceae	3	3
	Cortinariaceae	4	9
	Crepidotaceae	1	1
	Entolomataceae	1	1
	Hygrophoraceae	2	9
	Inocybaceae	1	1
	Marasmiaceae	14	48
	Mycenaceae	2	22
	Pleurotaceae	1	2
	Pluteaceae	1	2
	Psathyrellaceae	3	4
Boletales	Strophariaceae	4	12
	Tricholomataceae	18	25
Russulales	Boletaceae	7	11
	Boletinellaceae	1	2
	Gyroporaceae	1	1
Cantharellales	Cantharellaceae	1	1
Russulales	Russulaceae	2	9
Total		73	175

AGRADECIMIENTOS

Las autoras agradecen al Herbario de la Universidad de Antioquia (**HUA**) por el préstamo de colecciones y a todos los integrantes del Grupo de Taxonomía y Ecología de Hongos, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, que participaron en la elaboración de las bases de datos. Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto “Estrategia para la Sostenibilidad de Grupos A y B - 2007-2008”, financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia.

REFERENCIAS

- Aldana-Gómez R, Franco-Molano AE. 2001. A new species of *Gloiocephala* from Colombia. Mycotaxon, 80: 447-452.
- Baroni TJ, Franco-Molano AE, Lodge DJ, Lindner DL, Horak E, Hofstetter V. 2007. *Arthromyces* and *Blastosporella*, two new genera of conidia-producing lyophylloid agarics (Agaricales, Basidiomycota) from the Neotropics. Mycological Research, 11: 572-580.
- Betancur MA, Calderón MH, Betancourt OG, Sucerquia AG. 2007. Hongos macromycetes en dos relictos de bosque húmedo tropical montano bajo de la vereda la Cuchilla, Marmato, Caldas. Boletín Científico del Museo de Historia Natural Universidad de Caldas, 11: 19-31.
- CABI Bioscience, CBS, Landcare Research. 2008. Index fungorum. Fecha de acceso: 2008 noviembre 09. Disponible en: <www.indexfungorum.org>.

- Cardona B, Saldarriaga Y, Guzmán-Dávalos L. 2005. Registro de *Gymnopilus rugulosus* (Agaricales, Cortinariaceae) de Colombia. Revista Mexicana de Micología, 21: 55-58.
- Corrales A, López-Quintero CA. 2005. *Macrocybe titans* (Bigelow y Kimbr.) Pegler, Lodge y Nakasone, un registro nuevo para Colombia. Actualidades Biológicas, 27 (82): 89-96.
- Dennis RWG. 1970. Fungus flora of Venezuela and adjacent countries Kew Bulletin Additional Series III. J. Cramer. Vaduz. Londres: Stationery Office Books H. M. S. O. p. 531.
- Franco-Molano AE. 1993. Studies on *Cystoderma*: a new species and a new combination. Mycologia, 85(4): 672-676.
- Franco-Molano AE, Aldana R, Halling R. 2000. Setas de Colombia (Agaricales, Boletales y otros hongos). Guía de Campo. Medellín (Colombia): Colciencias-Universidad de Antioquia.
- Franco-Molano AE, Uribe-Calle E. 2000. Hongos Agaricales y Boletales de Colombia. Biota Colombiana, 1 (1): 25-43.
- Franco-Molano AE, Vasco-P. AM, López-Quintero C, Boekhout T. 2005. Macrohongos de la región del medio Caquetá. Guía de campo. Medellín (Colombia): Multimpresos.
- Franco-Molano AE, López-Quintero CA. 2007. A new species of *Hygroaster* (Hygrophoraceae, Agaricales) from Colombia. Mycotaxon, 99: 189-195.
- Guzmán G, Varela L. 1978. Los hongos de Colombia III. Observaciones sobre los hongos, líquenes y mixomicetos de Colombia. Caldasia, 12 (58): 309-338.
- Guzmán G, Saldarriaga Y, Pineda F, García G, Velásquez LF. 1994. New species of *Psilocybe* from Colombia and discussions on the known species. Mycotaxon, 51: 225-235.
- Guzmán G, Torres M, Ramírez-Guillén F, Ríos-Hurtado A. 2004. Introducción al conocimiento de los Macromicetos del Chocó, Colombia. Revista Mexicana de Micología, 19: 33-43.
- Guzmán G, Franco-Molano AE, Ramírez-Guillén F. 2007. New section and new species of a bluing *Psilocybe* (Fungi, Basidiomycotina, Agaricales) from Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 31: 469-472.
- Halling R. 1989. A Synopsis of Colombian Boletes. Mycotaxon, 44 (1): 93-113.
- Halling R. 1992. A new species of *Boletus* section Luridi from Colombia. Brittonia, 43 (3): 322-325.
- Halling R. 1996. Boletaceae (Agaricales): Latitudinal biodiversity and biological interactions in Costa Rica and Colombia. Revista de Biología Tropical, 44 (Suppl. 4): 111-114.
- Halling R, Mueller G, Dallwitz M. 1999. A new *Phylloporus* (Basidiomycetes, Boletaceae) with a key to species in Colombia and Costa Rica. Mycotaxon, 73: 63-67.
- Halling R, Mueller G. 2005. Common mushrooms of the Talamanca Mountains Costa Rica. New York: (U. S. A.): The New York Botanical Garden Press. p. 195.
- Holmgren PK, Holmgren NH. 1998. Onwards (continuously updated) Index Herbariorum. New York Botanical Garden. Fecha de acceso: 2010 enero 25. Disponible en: <<http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp>>.
- Horak E, Halling R. 1991. New records of *Phaeocollybia* from Colombia. Mycologia, 83: 464-472.
- López-Quintero C, Vasco-P. AM, Franco-Molano AE. 2007. Macrohongos de un bosque de roble, *Quercus humboldtii* (Fagaceae). En: Naranjo-Narváez G, Toro-Murillo JL, Idárraga-Piedrahita A, Cardona-Naranjo F, Pérez-Pareja S, Aguirre-Arias GA, editores. Reserva Natural Regional Cuchilla Jardín Támesis Antioquia, una mirada a su biodiversidad. Medellín, Colombia. p. 21-34.
- Mata J, Petersen R, Hughes K. 2001. The genus *Lentinula* in the Americas. Mycologia, 93(6): 1102-1112.
- Montoya F, Arias D, Betancur-Agudelo M. 2005. Contribución al conocimiento de los hongos Macromicetos del Resguardo Indígena Nuestra Señora de la Candelaria de La Montaña Riosucio, Caldas. Boletín Científico (Centro de Museos) Museo de Historia Natural, 9: 19-30.
- Mueller G. 1996. Distribution and species composition of *Laccaria* in tropical and subtropical America. Revista de Biología Tropical, 44 (Suppl. 4): 131-135.
- Mueller G, Wu Q. 1997. Mycological contributions of Rolf Singer: Field Itinerary, Index to New Taxa, and List of Publications. Fieldiana, 38: 1-124.
- Mueller G, Singer R. 1988. *Laccaria gomezii*, a new agaric species from the querceta of Colombia and Costa Rica. Mycotaxon, 23: 223-227.
- Pegler DN. 1983. Agaric flora of the Lesser Antilles. (Kew Bulletin Additional Series IX). Londres: Stationery Office Books H. M. S. O. p. 668.
- Petersen RH, Mueller G. 1992. New South American taxa of *Cantharellus*, *C. nothofagorum*, *C. xanthoscaphus*, and *C. lateritius* var. *colombianus*. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 28 (1-4): 195-200.
- Pineda F, García G, Velásquez V, Saldarriaga Y. 1988. Descripción y nuevos registros de *Marasmius* (Tricholomataceae) en Colombia. Actualidades Biológicas, 17 (64): 99-106.
- Pulido MM. 1983. Estudios en Agaricales Colombianos —los hongos de Colombia IX. Biblioteca José Jerónimo Triana N.º 7. Bogotá (Colombia): Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. p. 143.
- Pulido MM, Boekhout T. 1989. Distribution of macrofungi along the Parque los Nevados transect. En: van der Hammen T, Díaz-Piedrahita S, Álvarez V, editors. Studies in Tropical Andean Ecosystems. Berlin: J. Cramer. p. 485-505.
- Saldarriaga Y, Pineda F, García G, Velásquez L, Guzmán G. 1988. Nuevos registros de Agaricales en Colombia. Revista Mexicana de Micología, 4: 333-342.

- Singer R. 1974. A Monograph of *Favolaschia*. Nova Hedwigia, 50: 1-108.
- Singer R. 1976. Marasmiae (Basidiomycetes-Tricholomataceae). Flora Neotropica (Monograph), 17: 1-349.
- Singer R. 1982. *Hydropus* (Basidiomycetes-Tricholomataceae-Mycenaceae). Flora Neotropica (Monograph), 32: 1-153.
- Singer R, Araujo I, Ivory MH. 1983. The ectotrophically mycorrhizal fungi of the neotropical lowlands, especially central Amazonia (litter decomposition and ectomycorrhiza in Amazonian forests 2.). (Beihefte zur Nova hedwigia; Heft 77) Vaduz (Liechtenstein): J. Cramer. p. 352.
- Singer R. 1986. The Agaricales in the modern taxonomy. Koenigstein (Germany): Koeltz Scientific Books. p. 981.
- Singer R, Ovrebo CL, Halling R. 1990. A new species of *Phylloporus* and a new species of *Tricholomopsis* from Colombia with notes on *Phylloporus boletinoides*. Mycologia, 82: 452-459.
- Torres G, Hurtado AL. 2003. Micobiota nativa con potencialidades medicinales en el municipio de Quibdó. Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó, 18: 3-9.
- Tulloss R, Ovrebo C, Halling R. 1992. Studies on Amanita (Amanitaceae) from Andean Colombia. Memories of the New York Botanical Garden, 66: 27-30.
- Tulloss R, Franco-Molano AE. 2008. Studies in *Amanita* subsection Vittadiniae 1 —a new species from Colombian savana—. Mycotaxon, 105: 317-324.
- Vasco-P AM, Franco-Molano AE. 2005. A new species of *Gloeocantharellus* (Fungi-Basidiomycetes) from Colombian Amazonia. Mycotaxon, 91: 87-92.
- Vasco-P AM, Franco-Molano AE, López-Quintero C, Boekhout T. 2005. Macromicetes (Ascomycota, Basidiomycota) de la región del Medio Caquetá, departamentos de Caquetá y Amazonas (Colombia). Biota Colombiana, 6(1): 127-159.
- Velásquez L, Saldarriaga Y, Pineda F, García G. 1988. Nuevos registros de hongos en Colombia (departamento de Antioquia) descripción de algunos Agaricales. Actualidades Biológicas, 18 (66): 74-94.

Anexo 1. Listado de las especies de macromicetes recopiladas para Colombia (órdenes Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales; § = véase texto para abreviaturas de los departamentos de Colombia; §§ = véase texto para abreviaturas de la colecciones)

Taxones					
ORDEN AGARICALES	Distribución en Colombia§	Altitud (m)	Colección§§		Referencia bibliográfica
Agaricaceae					
<i>Chlorophyllum hortense</i> (Murrill) Vellinga *	ANT	1.560-1.660	Franco-Molano 575, 674 (HUA)		HUA
<i>Chlorophyllum molybdites</i> (G. Mey.) Masse	ANT, MAG, NAR	1.560	Lopera 610 (HUA) L López-Q 516 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Coprinus comatus</i> (O. F. Müll.) Pers.	ANT, TOL	1.450-1.750	Franco-Molano s. n.; Jaramillo 13; Pineda 132 (HUA)		Pulido 1983
<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod *	NAR	2.100	Franco-Molano 439 (HUA)		HUA
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm.*	ANT	400	García 15 (HUA)		HUA
<i>Lepiota hemisclera</i> (Berk. & M. A. Curtis) Sacc.	AMA	250	López-Q 1035 (HUA)		Halling y Mueller 2005
<i>Leucoagaricus rubrotinctus</i> (Peck) Singer	ANT, QUI	1.800-3.250	Franco-Molano 886 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i> (Corda) Singer	AMA, ANT, CAL, CAQ, CHO	100-2.100	López-Q 954, 887 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000; Betancur et al. 2007
<i>Leucocoprinus brunneascens</i> (Peck) Pegler	PNN Nevados		Pulido 1035		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Leucocoprinus cepistipes</i> (Sowerby) Pat.	ANT, MET	750	Corrales 237 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Leucocoprinus fragilissimus</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pat.	ANT, CAQ, MET	2.200	Franco-Molano s. n.		Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Mueller 2005; Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2000.
<i>Leucocoprinus sulphurellus</i> Pegler	ANT, CAQ, QUI, MET	100-1.800	Vasco-P 237; Franco-Molano 1604 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
Bolbitiaceae					
<i>Agrocybe earlei</i> (Murrill) Dennis ex Singer	CUN		Franco-Molano 688 (HUA)		HUA
<i>Conocybe mesospora</i> Kühner ex Watling	PNN Nevados	2.940	Boekhout 833		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Panaeolus subbalteatus</i> (Berk. & Broome) Sacc.	PNN Nevados	1.000	Pulido 1154		Pulido-León y Boekhout 1989

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
Agaricaceae					
Cortinariaceae					
<i>Corticarius iodes</i> Berk. & M. A. Curtis	ANT, CUN, NAR, VAL	2.205	Franco-Molano '783; Halling 6063; Desjardín 4905 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Corticarius violaceus</i> (L.) Gray	ANT	2.300-2.785	López-Q 208; Saldarriaga 990 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Galerina cerina</i> var. <i>nebulosum</i> A. H. Sm. & Singer	PNN Nevados	3.600-3.800	Boekhout 464, 539		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Galerina emmerensis</i> var. <i>intermedia</i> A. H. Sm. & Singer	PNN Nevados	3.550	Boekhout 378		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Galerina hypsistyzga</i> Singer	PNN Nevados		Pulido 1239		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Galerina yungicola</i> Singer	PNN Nevados	3.755	Boekhout 310		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Gymnophilus rugulosus</i> R. Valenz., Guzmán & J. Castillo	ANT	2.500-3.200	Franco-Molano 923; Ovrebo 2517 (NY, HUA); Saldarriaga 1178 (HUA, IBUG)		Cardona et al. 2005
<i>Phaeocollybia queretorum</i> Singer	ANT, CAL	2.100-2.700	Franco-Molano 1492 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000; Betancur et al. 2007.
<i>Phaeocollybia singularis</i> E. Horak & Halling	NAR	2.700	Franco-Molano 1490 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
Crepidotaceae					
<i>Crepidotus amillarum</i> (Pat.) Singer	PNN Nevados	2.350	Pulido 931		Pulido-León y Boekhout 1989
Entolomataceae					
<i>Clitopilus argentinus</i> Singer	PNN Nevados	2.125	Pulido 975		Pulido-León y Boekhout 1989
Hygrophoraceae					
<i>Hygrocybe chlorochlora</i> Pegler & Fiard *	CAU	1.640	Franco-Molano 417 (NY)		HUA
<i>Hygrocybe conica</i> var. <i>conica</i> (Scop.) P. Kumm.	ANT, CAL, QUI	2.205	Corrales 106, 134; Halling 5009 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000; Betancur et al. 2007
<i>Hygrocybe laeta</i> var. <i>laeta</i> (Pers.) P. Kumm.	ANT	2.300-2.800	Betancur 45; Flórez 8; Sierra 23 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000; López-Q et al. 2007
<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr.) P. Kumm.	AMA, ANT, QUI, TOL	250-3.100	Vasco-P. 188; Franco-M 1679; Trujillo 362 (HUA)		Halling y Mueller 2005; Vasco-P et al. 2005

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección ^{##}	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Hygrocybe naranjana</i> Pegler	PNN Nevados	3.725 2000	Boekhout 411 Garcia 157 (HUA)		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Hygrocybe subflavida</i> (Murrill) Pegler *	ANT	2.300-2.700	Aldana 185, 344 (HUA)		HUA
<i>Hygrocybe virginea</i> var. <i>virginea</i> (Wulfen) P. D. Orton & Wäthling *	ANT				HUA
<i>Hygrophorus hondurensis</i> (Murrill) Murrill	PNN Nevados	3.530	Boekhout 369		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Hygrophorus obconicus</i> Peck	PNN Nevados	2.940	Boekhout 544		Pulido-León y Boekhout 1989
Inocybaceae					
<i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.) Gillet *	ANT	3.000	Franco- Molano 1532 (HUA)		HUA
Marasmiaceae					
<i>Chaetodonthus liliptianus</i> (Mont.) Singer	ANT, CUN, RIS, VAL	2.500	Aldana 411; Arboleda 7 (HUA)		Franco Molano 2000; Pulido, M. 1983; Pulido-León y T. Boekhout
<i>Crinipellis eggersii</i> Pat. *	AMA, ANT	340	Restrepo 7 (HUA)		HUA
<i>Crinipellis pseudostipitaria</i> Singer *	ANT	1.600	Henao 879 (HUA)		HUA
<i>Cyptotrama asprata</i> (Berk.) Redhead & Gims * Cyptotrama asprata (Berk.) Redhead & Gims *	ANT	1.100-2.700	Franco-Molano 918; García 93 (HUA)		HUA
<i>Dactylosporina steffanii</i> (Rick) Dörfelt	AMA, ANT, CAQ, MAG	250-2.205	Corrales 56; Franco-Molano 1711 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Muller 2005; Vásco-P. et al. 2005
<i>Flammulina callistosporoides</i> (Singer) Singer	PNN Nevados	3.550	Boekhout 409		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Gliocephala confusa</i> Singer	PNN Nevados	3.335	Boekhout 427		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Gliocephala lamellosa</i> Singer	PNN Nevados	2.185-3.500	Boekhout 495, 496		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Gliocephala querstorum</i> Ald.-Góm. & Franco-Mol.,	ANT	2.700	Mejia 2; Zalamea 156 (HUA)		Aldana-Gómez y Franco-Molano 2001
<i>Gliocephala quitenensis</i> Singer	PNN Nevados	2.350	Pulido 952		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Lentinula boryana</i> (Berk. & Mont.) Pegler	ANT, BOY, CAL, QUI, TOL	2.400-2.950	Franco-Molano 1802 (HUA)		Halling y Mueller 2005; Franco-Molano, E. 2002; Montoya et al. 2005
<i>Marasmiellus corynophloeus</i> Singer					Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmiellus epochnous</i> (Berk. & Broome) Singer					Pulido-León y Boekhout 1989

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección ^{§§}	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Marasmiellus laurifoliae</i> Singer	PNN Nevados	2.700	Pulido 1178		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmiellus merulius</i> (Bertero) Singer	PNN Nevados	3.500	Boekhout s. n.		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmiellus ramealis</i> var. <i>tucumanensis</i> Singer	PNN Nevados	2.940	Pulido 1178		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmiellus stenophylloides</i> (Dennis) Dennis	PNN Nevados	1.000	Pulido 1151		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmiellus tener</i> Singer	PNN Nevados	1.000	Pulido 1158		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmiellus trojanus</i> (Murrill) Dennis *	CAQ	250	Franco-Molano 832 (HUA)	HUA	
<i>Marasmius beniensis</i> Singer	ANT	400-1.100	Pineda 2 (HUA)	Pineda et al. 1988	
<i>Marasmius berteroii</i> (Lév.) Murrill	ANT, VAL	400	Saldarriaga 5; Arboleda 18 (HUA)	Pineda et al. 1988; Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Marasmius berteroii</i> var. <i>major</i> Singer	BOL, VAL	50	Aldana 304 (HUA); Singer B 6295 (F)	HUA	
<i>Marasmius bezerraiae</i> Singer	ANT	108-400	Saldarriaga 7 (HUA)	Pineda et al. 1988	
<i>Marasmius buzae</i> Dennis *	ANT	1.100-2.400	Halling 5031 (HUA)	HUA	
<i>Marasmius cladophylloides</i> Berk.	AMA, ANT, CHO	300-1.110	López-Q 931, Saldarriaga 4 (HUA)	Pineda et al. 1988; Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Marasmius cohaerens</i> (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.	ANT, CAQ, TOL	2.450-3.250	Trujillo 401 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Marasmius copelandii</i> Peck *	ANT	2.250	Halling 5261 (HUA)	HUA	
<i>Marasmius crinis-equi</i> F. Muell. ex Kalchbr.	PNN Nevados	2.350	Pulido 955	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Marasmius cypresiformis</i> Berk.	ANT	400	Saldarriaga 13 (HUA)	Pineda et al. 1988	
<i>Marasmius echinosphaerus</i> Singer	PNN Nevados	1.725	Pulido 1046	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Marasmius fuh-oferrugineus</i> Gilliam *	ANT	2.350	Desjardin 4737 (HUA)	HUA	
<i>Marasmius haematocephalus</i>	BOL, CHO, QUI	30	Aldana 312 (HUA)	HUA	
var. <i>pseudolageticolor</i> Singer					
<i>Marasmius jalapensis</i> Murrill *	ANT	2.620	Halling 5030 (HUA)	HUA	

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Marasmius manuripiensis</i> Singer	PNN Nevados	3.600-3.800			Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmius marthae</i> Singer	ANT	400-1.100	Velasquez 12 (HUA)		Pineda et al. 1988
<i>Marasmius munyozi</i> Singer	PNN Nevados	2.700	Pulido 1177		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmius pallidocinctus</i> var. <i>latisporus</i> Singer	PNN Nevados	3.725-3.755	Boekhout 292, 570		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmius protelarius</i> Berk. & M. A. Curtis	ANT	50-400	Velasquez 13 (HUA)		Pineda et al. 1988
<i>Marasmius sejunctus</i> Singer	PNN Nevados	1.250	Pulido 1126		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Marasmius tageticolor</i> Berk.	AMA, CAQ	250	Franco-Molano 1674; López-Q 376 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Marasmius variabiliceps</i> Singer	PNN Nevados	2.350	Pulido 933		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Micromphale brevipes</i> (Berk. & Ravenel) Singer	PNN Nevados	2.500	Pulido 866A		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Rhodocollybia popayanica</i> (Halling) Halling	ANT	2.205	Franco-Molano 1767 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Rhodocollybia turpis</i> (Halling) Halling	ANT	2.400-2.700	Álvarez 163 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
<i>Skepperella spathularia</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pilát *	AMA	300	Franco-Molano 1774 (HUA)		HUA
<i>Tetrapyrgos alba</i> (Berk. & M.A. Curtis) E. Horak	ANT, CAL, TOL	2.700-3.100	Flórez 5; Tobón 997 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000; Montoya et al. 2005; Betancur et al. 2007
<i>Tetrapyrgos reducta</i> (Singer) E. Horak	PNN Nevados	2.350	Pulido 962		Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Xerula hispida</i> Halling & G. M. Muller	ANT	2.540-3.000	Aldana 177, 212, 222, 287; Bustamante 6 (HUA)		Franco-Mol. et al. 2000
Mycenaceae		VAL			
<i>Favolaschia alsophila</i> Singer	VAL	1.900	Singer 6443 (F)		Singer 1974
<i>Favolaschia andina</i> Singer	CUN	3.700	Singer 7022 (F)		Singer 1974
<i>Favolaschia cinnabarinia</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pat.	ANT, VAL	1.000	Franco-Molano 669a (HUA); Singer B 6167 (F)		Singer 1974
<i>Favolaschia dealbata</i> Singer	PNN Nevados	3.600-3.800	Boekhout 521b		Pulido-León y Boekhout 1989

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Favolaschia intermedia</i> (Berk. & M. A. Curtis) Singer	PNN Nevados	1.250-2.125	Pulido 1011, 1122 (COL)	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Favolaschia oligopora</i> Singer	VAL	50	Singer 6279 (F)	Singer 1974	
<i>Favolaschia pantherina</i> Singer	PNN Nevados	3.600-3.800	Boekhout 492	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Favolaschia pierigena</i> Singer	ANT	2.700	Zalamea 158 (HUA)	HUA	
<i>Favolaschia pygmaea</i> (Speg.) Singer	VAL, PNN Nevados	3.600-3.800	Boekhout 146; Singer 6975	Singer 1974	
<i>Favolaschia roseogrisea</i> Singer	CUN, TOL	1.814-2.467	Singer 6035 (F)	Singer 1974	
<i>Favolaschia selloana</i> Henn.	VAL	2.050-2.100	Cuatrecasas 18349 (F)	Singer 1974	
<i>Favolaschia subcercea</i> (Henn.) Donk	PNN Nevados	2.350-2.940	Boekhout 551; Pulido 929 (COL)	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Favolaschia variotecta</i> Singer	VAL	50	Singer 2659 (F)	Singer 1974	
<i>Mycena aff. junquillina</i> Denni	PNN Nevados	2.700	Pulido 811	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) P. Kumm.	ANT, CAL, TOL	2.540-3.100	Gómez 2; Trujillo 372 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Betancur 2007	
<i>Mycena alphiophora</i> (Berk.) Sacc.	PNN Nevados	2.350-3.550	Boekhout 398, 494	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Mycena holoporphryra</i> (Berk. & M. A. Curtis) Singer	ANT, TOL	400-300	De Escobar 6399; Franco-Molano 1819 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Mycena margarita</i> Murrill *	ANT, TOL	2.100-2.350	Botero 11; Curso Agaricales s. n. (HUA)	HUA	
<i>Mycena parabolica</i> (Fr.) Quél. *	ANT	2.600	Aldana 97, 357 (HUA)	HUA	
<i>Mycena paraboliciformis</i> Singer *	ANT	2.400-2.739	Aldana 96; Muñetón 471 (HUA)	HUA	
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm.	ANT, CAL	2.550	Tobón 1075 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Betancur et al. 2007.	
<i>Mycena stylobates</i> (Fr.) Quél.	PNN Nevados	2.700	Pulido 826	Pulido-León y Boekhout 1989	
Pleurotaceae					
<i>Hohenbuehelia barbatula</i> Berk. & Cooke	PNN Nevados	4.125	Boekhout 593a	Pulido-León y Boekhout 1989	

(Continuación Anexo 1)

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Hohenbuehelia nigra</i> (Schwein.) Singer	AMA, ANT	ANT, CAL, CAQ	2.205	Arias 6; Corrales 200; Franco-Molano 1778 (HUA)	HUA; Vasco-Palacios et al. 2005.
<i>Hohenbuehelia silvana</i> (Sacc.) O. K. Mill.	PNN Nevados	PNN Nevados	3.730	Boekhout 607A	Pulido-León y Boekhout 1989
Pluteaceae					
<i>Pluteus globiger</i> Singer *	ANT	ANT	2.100-2.400	Franco-Molano 1804a (HUA)	HUA
<i>Pluteus jamaicensis</i> Murrill	PNN Nevados	PNN Nevados	3.335	Boekhout 422	Pulido-León y Boekhout 1989
Psathyrellaceae					
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J. E. Lange	ANT, CAL, CAQ	250-1.450	López-Q 521; Vasco-P. 405, 480 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2005; Betancur et al. 2007	
<i>Coprinellus pelliculosus</i> (P. Karst.) Redhead	PNN Nevados	3.550	Boekhout 385	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Coprinopsis urticicola</i> (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	PNN Nevados		Pulido 1336	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	PNN Nevados		Franco-Molano s. n.	Pulido-León y Boekhout 1989	
Strophariaceae					
<i>Hypholoma sublateritium</i> (Schaeff.) Quéel *	ANT	ANT	2.205	Corrales 191; Saldarriaga 1006 (HUA)	HUA
<i>Melanotus cassiaeicolor</i> (Berk.) Singer	PNN Nevados		Pulido 1382	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Pholiota aberrans</i> A. H. Sm. & Hesler *	ANT		Álvarez 171, 176; López-Q 188; Trujillo 485 (HUA)	HUA	
<i>Pholiota apiayna</i> Speg.	PNN Nevados		Pulido 1454	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Pholiota naucoroides</i> Singer	PNN Nevados		Boekhout 434	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Psilocybe antioquiensis</i> Guzmán, Saldarriaga, Pineda, García & Velázquez	ANT		Guzmán 29562-B (HUA), 29560-B, 29567-B, 29569-B (HUA, XAL)	Guzmán et al. 1994	

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección ^{##}	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Psilocybe bispora</i> Guzmán, Franco-Mol. & Ram.-Guill.	ANT		2.500	Franco-Molano 1766	Guzmán et al. 2007
<i>Psilocybe guatapensis</i> Guzmán, Saldarr., Pineda, G. García & L.-F. Velásquez	ANT		1.850	Guzmán 29571-B (HUA, XAL)	Guzmán et al. 1994
<i>Psilocybe heliconiae</i> Guzmán, Saldarr., Pineda, G. García & L.-F. Velásquez	ANT, CAQ		500-1.000	Parra s. n. (holotipo HUA, isótipo XAL); Parra & Echeverri 2 (HUA, XAL)	Guzmán et al. 1994
<i>Psilocybe phyllogea</i> (Peck) Peck	BOY		3.450-3.500	Díaz 1394 (COL, ENCB)	Pulido 1983
<i>Psilocybe subacutipilea</i> Guzmán, Saldarr., Pineda, G. García & L.-F. Velásquez	ANT		1.100	Guzmán 29561-B (holotipo HUA, isótipo XAL)	Pineda et al. 1988
<i>Psilocybe wrightii</i> Guzmán *	ANT		2.800	Álvarez 21 (HUA)	HUA
Tricholomataceae					
<i>Blastosporella zonata</i> T. J. Baroni & Franco-Mol.	TOL		2.950	Corrales 211 (HUA)	Baroni et al. 2007
<i>Collybia aurea</i> (Beele) Pegler	ANT, CAQ, MAG, MET		250-2.739	Franco-Molano 747, 861, 988, 1008; Vasco-P. 511 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
<i>Collybia neotropica</i> Singer	ANT, CAQ, MAG, PNN		2.125	Vargas 46 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
<i>Collybia plectophylla</i> (Mont.) Singer	Nevados ANT, CAL, CAQ		250-1.800	Franco-Molano 579, 594, 888 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Betancur et al. 2007
<i>Collybia syringea</i> Singer	PNN Nevados		2.350	Pulido 959	Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Cystoderma chocoanum</i> Franco-Mol.	CHO		70	Franco-Molano et al. 629 (Holotypus, Col.; Isotypus, NY)	Franco-Mol. et al. 1993
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill	ANT, CAL, CUN, PNN		2.940	Boekhout 817	Franco-Mol. et al. 2000; Pulido-León y Boekhout 1989; Betancur et al. 2007
<i>Gymnopus omphalodes</i> (Berk.) Halling & J. L. Mata	ANT, CHO		2.675	Franco-Molano 658 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Mueller 2005
<i>Hydropus hutescentipes</i> Singer	PNN Nevados		2.700	Pulido 828	Pulido-León y Boekhout 1989
<i>Hydropus subcartilagineus</i> (Murrill) Singer *	ANT		2.700	Tobón 985 (HUA)	HUA

(Continuación Anexo 1)

Taxones		Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colección ^{§§}	Referencia bibliográfica
ORDEN AGARICALES					
<i>Hygroaster cleefii</i> Franco-Molano & López-Quintero	CAQ, CHO, CAU	200-300	Franco-Molano 651; López-Q. Vasco-P. 506; López-Q 226 (HUA); Pulido 3330 (COL)	Franco-Mol. y López-Q. 2007	
<i>Hygroaster nodulisporus</i> (Dennis) Singer	AMA, CAQ	250	(HUA)	Vasco P. et al. 2007	
<i>Lactocollybia epia</i> (Berk. & Broome) Pegler	ANT	500	Ovrebo 2459 (HUA)	HUA	
<i>Leptista subisabellina</i> (Murrill) Pegler	ANT	1.540	Arboleda 9, 27; López-Q 705 (HUA)	HUA	
<i>Leucopaxillus gracilimus</i> Singer & A. H. Sm.	ANT	1.300-2.400	Franco-Molano 752 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Lichenomphalia alpina</i> (Britzelm.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgaly	PNN Nevados	4.150-4.475	Boekhout 127, 619	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Macrocybe titans</i> (H.E. Bigelow & Kimbr.) Pegler, Lodge & Nakasone	ANT, SANT	500	Cardona s. n. 232 (HUA)	Corrales y López-Q 2005	
<i>Megacollybia platynympha</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	ANT	2.205-2.700	Franco-Mol. 1012 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Omphalina pseudofibula</i> Dennis	PNN Nevados	4150	Boekhout 146; Pulido 1228 (COL)	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Resinomyces saccharifera</i> (Berk. & Broome) Redhead	PNN Nevados	3.185-3.555	Boekhout 398, 494	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer	PNN Nevados	2.700-3.730	Boekhout 617; Pulido 1172 (COL)	Pulido-León y Boekhout 1989	
<i>Ripariella alba</i> Halling & Franco-Mol.	CAL, QUI	2.100	M. Calderón H. 15 (Caldas)	Franco-Mol. et al. 2000; Betancur et al. 2007.	
<i>Tricholomopsis humboldtii</i> Singer, Ovrebo & Halling	ANT	2.550	Ovrebo 2563 (HUA, NY), 2554 (Holotipo HUA, Isotipo CSU, NY)	Singer et al. 1990; Franco-Mol. et al. 2000	
<i>Tricholomopsis tropica</i> Dennis *	AMA		Franco-Molano 1788 (HUA)	HUA	
ORDEN BOLETALES					
Boletaceae					
<i>Boletus chrysenteron</i> Bull.*	ANT, NAR		Franco-Molano 922 (NY)	HUA	
<i>Boletus neoregius</i> Halling & G. M. Muell.	ANT, CUN	2.500	Gómez 214 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000	

Taxones		Distribución en Colombia§		Altitud (m)	Colección§§	Referencia bibliográfica
ORDEN BOLETALES	Boletaceae	ANT, TOL	ANT, CAU, TOL	2.200-3.000	Halling 6075; Franco-Molano 115 (HUA)	HUA
	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille *			2.650-2.800	Aldana 87; Bedoya 13; Franco-Molano 495 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
	<i>Leccinum rugosiceps</i> (Peck) Singer	ANT		2.500-2.800	Vasco-P. 1128 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Mueller 2005; López-Q. et al. 2007
	<i>Leccinum talamancae</i> Halling, L. D. Gómez & Lannoy	ANT		2.550	Álvarez 93; López-Q 182 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Mueller 2005
	<i>Phylloporus centroamericanus</i> Singer & L. D. Gómez	ANT		2.450-2.730	Aldana 94, 189; Franco-Molano 1544; López-Q 87 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Mueller 2005
	<i>Phylloporus phaeoxanthus</i> Singer & L. D. Gómez	ANT		2.205	Franco-Molano 1010	Franco-Mol. et al. 2000
	<i>Pulveroboletus ravenelii</i> (Berk. & M.A. Curtis) Murrill	ANT		2.350	Halling 5008 (Holotipo: HUA, isotipo: NY)	Halling 1989
	<i>Tylopilus obscurus</i> Halling			2.700	Halling 6146, 6111 (NY)	HUA
	<i>Tylopilus umbrinus</i> (G. F. Atk.) A. H. Sm. & Thiers *	NAR			Halling 6144, 6117 (NY)	Franco-Mol. et al. 2000
	<i>Xanthocnium separans</i> (Peck) Halling & Both	NAR				
Boletellaceae						
	<i>Phlebopus beniensis</i> (Singer & Digilio) Heinem. & Rammeloo *	MAG		400-1.600	Franco-Molano 994 (NY); Halling 7561 (NY)	HUA
	<i>Phlebopus brasiliensis</i> Singer	MET		250	Franco-Molano 876 (NY, HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
Gyroporaceae						
	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quéel.	CAU		1.640	Franco-Molano 498 (NY)	Halling y Mueller 2005
ORDEN CANTHARELLALES						
Cantharellaceae						
	<i>Cantharellus guyanensis</i> Mont.	CAQ		160	Franco-Molano 816 (HUA, NY, F)	HUA

(Continuación Anexo I)

ORDEN RUSSULALES	Russulaceae	Distribución en Colombia [§]	Altitud (m)	Colecciónss	Referencia bibliográfica
	<i>Lactarius atroviridis</i> Peck	ANT	2.500	Halling 5070 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Muller 2005
	<i>Lactarius costaricensis</i> Singer	NAR	2.700	Halling 6151 (NY)	Halling y Mueller 2005
	<i>Lactarius deceptivus</i> Peck	ANT	2.340-2.900	Franco-Molano 107, 523, 756; Halling 4977, 6064, 5023 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
	<i>Lactarius fragilis</i> (Burl.) Hesler & A. H. Sm.	ANT	2.300-2.540	Aldana 80; Álvarez 147; Trujillo 321 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
	<i>Lactarius indigo</i> (Schwein.) Fr.	ANT, CAU, NAR	2.400	Franco-Molano 136 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000; Halling y Muller 2005
	<i>Lactarius rimosellus</i> Peck	ANT	2.540-2.850	Aldana 175; 262; Álvarez 161; Halling 6164; Trujillo 299 (HUA)	Franco-Mol. et al. 2000
	<i>Russula compacta</i> Frost	ANT	2.500	Aldana 105; Halling 5003, 5066, 5024 (HUA)	Halling y Mueller 2005
	<i>Russula peckii</i> Singer *	ANT	3.100	Aldana 101 (HUA)	HUA
	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	ANT		Franco-Molano s. n.	Franco-Mol. et al. 2000

Anexo 2. Lista de sinonimias

***Agrocybe earlei* (Murrill) Dennis ex Singer**, Sydowia 30(1-6): 205 (1978) [1977]. **Sinonimia:** *Naucoria earlei* Murrill, Mycologia 4(2): 77 (1912)

***Boletus chrysenteron* Bull.**, Histoire des Champignons: 328 (1791). **Sinonimia:** *Boletus communis* Bull., Herb. Fr. 9: tab. 393 (1789); *Boletus pascuus* sensu auct. brit.; fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005); *Ceriomyces communis* (Bull.) Murrill, Mycologia 1(4): 155 (1909); *Versipellis chrysenteron* (Bull.) Quél., Enchir. Fung. (Paris): 157 (1886); *Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 49 (2008); *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél., Fl. Mycol. France (Paris): 418 (1888); *Xerocomus communis* (Bull.) Bon, Docums Mycol. 14(no. 56): 16 (1985) [1984]

***Cantharellus guyanensis* Mont.**, Annals Sci. Nat., Bot. sér., 4 1: 107 (1854). **Sinonimia:** *Merulius guyanensis* (Mont.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 862 (1891)

***Chaetocalathus liliputianus* (Mont.) Singer**, Lilloa 8 (1943) [1942]. **Sinonimia:** *Pleurotus liliputianus* Mont., Crypt. Guyan.: no. 279 (1855)

***Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille**, Bull. Soc. Hist. Nat. Doubs 15: 39 (1908). **Sinonimia:** *Boletus piperatus* Bull., Herb. Fr. 10: tab. 451, fig. 2 (1790); *Boletus piperatus*; Bull., Herb. Fr. 10: tab. 451, fig. 2 (1790) var. *piperatus*; *Ceriomyces piperatus* (Bull.) Murrill, Mycologia 1(4): 150 (1909); *Ixocomus piperatus* (Bull.) Quél., Fl. Mycol. France (Paris): 414 (1888); *Leccinum piperatum* (Bull.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 647 (1821); *Suillus piperatus* (Bull.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3(2): 535 (1898); *Viscipellis piperata* (Bull.) Quél., Enchir. Fung. (Paris): 157 (1886)

***Chlorophyllum hortense* (Murrill) Vellinga**, Mycotaxon 83: 416 (2002). **Sinonimia:** *Lepiota hortensis* Murrill, North Amer. Fl. 10(1): 59 (1917); *Leucoagaricus hortensis* (Murrill) Pegler, Kew Bull., Addit. Ser. 9: 414 (1983)

***Chlorophyllum molybdites* (G. Mey.) Massee**, Bull. Misc. Inf., Kew: 136 (1898). **Sinonimia:** *Agaricus molybdites* G. Mey., Prim. fl. esseq.: 300 (1818); *Chlorophyllum esculentum* Massee, Bull. Misc. Inf., Kew (1898); *Lepiota*

molybdites (G. Mey.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 30 (1887); *Leucocoprinus molybdites* (G. Mey.) Pat., Bull. Soc. Mycol. France 29: 215 (1899); *Macrolepiota molybdites* (G. Mey.) G. Moreno, Bañares & Heykoop, Mycotaxon 55: 467 (1995); *Mastocephalus molybdites* (G. Mey.) O. Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 860 (1891)

***Collybia aurea* (Beeli) Pegler**, Kew Bull. 21(3): 516 (1968). **Sinonimia:** *Marasmius aureus* Beeli, Bull. Soc. R. Bot. Belg. 60(2): 155 (1928)

***Collybia plectophylla* (Mont.) Singer**, Lilloa 22: 200 (1951) [1949]. **Sinonimia:** *Marasmius plectophyllus* Mont., Ann. Sci. Nat., Bot. Ser. 4, 1: 11 (1854)

***Conocybe mesospora* Kühner ex Watling**, in Watling, Notes R. Bot. Gdn Edinb. 38(2): 336 (1980). **Sinonimia:** *Conocybe mesospora* f. *typica* Kühner, Encyclop. Mycol.: 58 (1935)

***Coprinellus disseminatus* (Pers.) J. E. Lange**, Dansk Bot. Ark. 9 (no. 6): 93 (1938); **Sinonimia:** *Agaricus disseminatus* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 403 (1801); *Agaricus disseminatus* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 403 (1801) var. *disseminatus*; *Agaricus striatus* sensu Sowerby [Col. Fig. Engl. Fung. Vol. 2, pl. 166 (1798)]; fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005); *Coprinarius disseminatus* (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 68 (1871); *Coprinus disseminatus* (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 634 (1821); *Psathyrella disseminata* (Pers.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 123 (1872); *Pseudocoprinus disseminatus* (Pers.) Kühner, Le Botaniste 20: 156 (1928)

***Coprinellus pellucidus* (P. Karst.) Redhead**, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 234 (2001). **Sinonimia:** *Coprinus pellucidus* P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora Fenn. 9: 61 (1882)

***Coprinopsis urticicola* (Berk. y Broome) Redhead, Vilgalys y Moncalvo**, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 232 (2001). **Sinonimia:** *Agaricus urticicola* Berk. & Broome [as “urticæcola”], Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 3 7: 376 (1861); *Coprinus brassicae* Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. 43: 64 (1890); *Coprinus urticicola* (Berk. & Broome) Buller, Trans. Br. Mycol. Soc. 5: 485

(1917) [1916]; *Pilosace urticicola* (Berk. & Broome) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 504 (1898); *Psathyra urticicola* (Berk. & Broome) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 1073 (1887)

Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers., Tent. Disp. Meth. Fung. (Lipsiae): 62 (1797). **Sinonimia:** *Agaricus comatus* O. F. Müll., Fl. Danic. 5: tab. 834 (1780); *Agaricus comatus* O. F. Müll., Fl. Danic. 5: tab. 834 (1780) var. *comatus*; *Agaricus comatus* var. *ovatus* (Schaeff.) Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 307 (1821); *Agaricus cylindricus* Sowerby, Col. fig. Engl. Fung. Mushr. (London) 2: pl. 189 (1799); *Agaricus fimetarius* Bolton, Hist. Fung. Halifax (Huddersfield) 1: 44, pl. 44 (1788); *Agaricus ovatus* Schaeff., Fung. Bavar. Palat. 1: tab. 7 (1762); *Coprinus comatus* var. *caprimammillatus* Bogart, The Genus *Coprinus* in Washington and Adjacent Western States [Ph.D. dissertation] (Seattle): 55 (1975); *Coprinus comatus* var. *ovatus* (Schaeff.) Quél., Enchir. Fung. (Paris): 121 (1886); *Coprinus ovatus* (Schaeff.) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 242 (1838) [1836-1838]

Cortinarius violaceus (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 217 (1821). **Sinonimia:** *Agaricus violaceus* L., Sp. pl. 2: 1173 (1753); *Agaricus violaceus* L., Sp. pl. 2: 1173 (1753) var. *violaceus*; *Gomphus violaceus* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 478 (1898)

Crepidotus antillarum (Pat.) Singer, Lilloa 13: 62 (1947). **Sinonimia:** *Tremellopsis antillarum* Pat., Enum. Champ. Guadeloupe (Lons-le-Saunier): 13 (1903)

Cyptotrama asprata (Berk.) Redhead y Ginns, Can. J. Bot. 58(6): 731 (1980); **Sinonimia:** *Agaricus aspratus* Berk., J. Bot., London 6: 481 (1847); *Armillaria asprata* (Berk.) Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya 4: 313 (1910); *Lepiota asprata* (Berk.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 48 (1887); *Xerula asprata* (Berk.) Aberdeen, Kew Bull. 16: 129 fig 1/1-3 (1962); *Xerulina asprata* (Berk.) Pegler, Kew Bull., Addit. Ser. 27(1): 196 (1972)

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9: 351 (1889). **Sinonimia:** *Agaricus carcharias* Pers., Tent. Disp. Meth. Fung. (Lipsiae): 19 (1797); *Agaricus carcharias* Pers., Tent. Disp. Meth. Fung. (Lipsiae): 19 (1797); *Agaricus granulosus* var. *carcharias* (Pers.) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 18 (1838) [1836-1838]; *Lepiota carcharias* (Pers.) P. Karst., Rysslands, Finlands och den Skandinaviska Halföns. Hattsvampar 32: 14 (1879); *Lepiota granulosa* var. *carcharias* (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 136 (1871)

Dactylosporina steffenii (Rick) Dörfelt, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 96(3): 237 (1985). **Sinonimia:** *Oudemansiella steffenii* (Rick) Singer, Lilloa 26: 66 (1953);

Tricholoma steffenii Rick, Broteria Ser. Bot. 24: 99 (1930); *Xerula steffenii* (Rick) Boekhout & Bas, Persoonia 13(1): 55 (1986)

Favolaschia cinnabrina (Berk. y M. A. Curtis) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 141 (1900). **Sinonimia:** *Laschia cinnabrina* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10 (no. 46): 322 (1868)

Favolaschia intermedia (Berk. y M. A. Curtis) Singer Beih., Nova Hedwigia 50: 91 (1974). **Sinonimia:** *Laschia intermedia* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10 (no. 46): 322 (1868)

Favolaschia pygmaea (Speg.) Singer, Lloydia 13: 254 (1951). **Sinonimia:** *Favolus pygmaeus* Speg., Fungi Fuegiani 11: 453 (1889)

Favolaschia selloana Henn., Hedwigia 36: 203 (1897). **Sinonimia:** *Favolaschia thwaitesii* subsp. *selloana* (Henn.) Singer, Lloydia 8: 212 (1945); *Laschia selloana* (Henn.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 14(1): 199 (1899)

Favolaschia subceracea (Henn.) Donk, Persoonia 1(1): 62 (1959). **Sinonimia:** *Cyphella subceracea* Henn., Hedwigia 36: 194 (1897); *Laschia longicellulis* Lloyd, Mycol. Writ. 5: 837 (1919)

Flammulina callistosporoides (Singer) Singer, Darwiniana 13: 183 (1964). **Sinonimia:** *Pseudohiatula callistosporoides* Singer [as "callistosporoides"], Sydowia 15: 59 (1962) [1961]

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 362 (1916). **Sinonimia:** *Agaricus dryophilus* Bull., Herb. Fr. 10: tab. 434 (1790); *Collybia aquosa* var. *dryophila* (Bull.) Kriegst., in Kriegsteiner, Ahnert, Endt, Enderle & Ostrow, Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 13: 36 (2000); *Collybia dryophila* (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 115 (1871); *Collybia dryophila* var. *alvearis* Cooke, Trans. Br. Mycol. Soc. 3: 110 (1909) [1908]; *Collybia dryophila* var. *aurata* Quél., Enchir. Fung. (Paris): 31 (1886); *Marasmius dryophilus* (Bull.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 103 (1889); *Marasmius dryophilus* var. *alvearis* (Cooke) Rea, Brit. Basidiomycetes, p. 525 (1922); *Marasmius dryophilus* var. *auratus* (Quél.) Rea, Brit. Basidiomyc. (Cambridge): 524 (1922); *Omphalia dryophila* (Bull.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 612 (1821)

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél., Enchir. Fung. (Paris): 161 (1886). **Sinonimia:** *Boletus castaneus* Bull., Herb. Fr. 7: tab. 328 (1788) [1787-88]; *Boletus cyanescens* var. *fulvidus* (Fr.) Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 395 (1821);

Boletus fulvidus Fr., Observ. Mycol. (Havniae) 2: 247 (1818); *Leucobolites castaneus* (Bull.) Beck, Z. Pilzk. 2: 142 (1923); *Leucobolites fulvidus* (Fr.) Beck, Z. Pilzk. 2: 142 (1923); *Suillus castaneus* (Bull.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 1 (1882); *Suillus fulvidus* (Fr.) Henn., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Teil. I (Leipzig) 1**: 190 (1898) [1900]

Hohenbuehelia barbatula Berk. y Cooke, kew Bull. Addit. Ser. 3: 48 (1970). **Sinonimia:** *Agaricus barbatulus* Berk. & M. A. Curtis, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 3 4: 287 (1859); *Dendrosarcus barbatulus* (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 463 (1898); *Pleurotus barbatulus* (Berk. & M. A. Curtis) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 377 (1887)

Hohenbuehelia nigra (Schwein.) Singer, Lilloa 22: 256 (1951). **Sinonimia:** *Agaricus niger* Schwein., Schr. Naturf. Ges. Leipzig 1: 90 (1822); *Calathinus niger* (Schwein.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 151 (1900); *Dendrosarcus niger* (Schwein.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 464 (1898); *Pleurotus niger* (Schwein.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 380 (1887); *Resupinatus niger* (Schwein.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(4): 242 (1915)

Hohenbuehelia silvana (Sacc.) O. K. Mill., La Famiglia delle Tricholomataceae, Atti del Convegno Internazionale di Micologia del 10-15 Settembre 1984 [preprint] (Borgo Val di Taro) 25: 131 (1986) [1984]. **Sinonimia:** *Acanthocystis silvana* (Sacc.) Konrad & Maubl., Icon. Select. Fung. 6: 309 (1937); *Agaricus silvanus* Sacc., Michelia 1(no. 1): 1 (1877)

Dendrosarcus silvanus (Sacc.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 464 (1898); *Geopetalum silvanum* (Sacc.) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 68 (1953); *Pleurotus silvanus* (Sacc.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 379 (1887); *Resupinatus silvanus* (Sacc.) Singer, Lilloa 22: 253 (1951) [1949]

Hydropus subcartilagineus (Murrill) Singer, Beih. Sydowia 7: 59 (1973). **Sinonimia:** *Omphalina subcartilaginea* Murrill, N. Amer. Fl. IX, p. 345 (1916)

Hygroaster nodulisporus (Dennis) Singer, Sydowia (1955). **Sinonimia:** *Hygrophorus nodulisporus* Dennis, Kew Bull. 8:259 (1953); *Omphalina nodulispora* (Dennis) Kühner [as "nodulisporus"], Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, Num. Spéc. 49: 893 (1980)

Hygrocybe conica (Scop.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 111 (1871) var. *conica*. **Sinonimia:** *Agaricus conicus* Scop., Fl. Carniol., Edn 2 (Wien) 2: 443 (1772)

Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 112 (1871) var. *laeta*. **Sinonimia:** *Agaricus laetus* Pers., Observ. Mycol. (Lipsiae) 2: 48 (1800) [1799]; *Gliophorus laetus* (Pers.) Herink, Sb. Severočeského Musea, Historia Naturalis 1: 84 (1958); *Hygrocybe laeta* (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 112 (1871); *Hygrophorus houghtonii* Berk. & Broome [as 'houghtoni'], Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 4 11: 342 (1873); *Hygrophorus laetus* (Pers.) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]

Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 112 (1871). **Sinonimia:** *Agaricus miniatus* Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 105 (1821); *Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 112 (1871) f. *miniata*; *Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau) (1871) var. *miniata*; *Hygrocybe strangulata* (P. D. Orton) Svrček, Česká Mykol. 16: 167 (1962); *Hygrophorus miniatus* (Fr.) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 330 (1838) [1836-1838]; *Hygrophorus strangulatus* P. D. Orton, Trans. Br. Mycol. Soc. 43(2): 266 (1960)

Hygrocybe subflavida (Murrill) Pegler, Kew Bull., Addit. Ser. 9: 58 (1983). **Sinonimia:** *Hydrocybe subflavida* Murrill, Mycologia 3(4): 197 (1911)

Hygrocybe virginea (Wulfen) P. D. Orton y Watling, Notes R. Bot. Gdn Edinb. 29(1): 132 (1969) var. *virginea*. **Sinonimia:** *Agaricus gleditschii* Humb., Fl. Friberg. Spec. (Berlin): 77 (1793); *Agaricus niveus* Scop., Fl. Carniol., Edn 2 (Wien) 2: 430 (1772); *Agaricus subradiatus* Schumach., Enum. Pl. (Kjbenhavn) 2: 333 (1803); *Agaricus virgineus* Wulfen, in Jacquin, Miscell. Austriac. 2: 104 (1781); *Camarophyllum niveus* (Scop.) Wünsche, Die Pilze: 115 (1877); *Camarophyllum subradiatus* (Schumach.) Wünsche, Die Pilze: 114 (1877); *Camarophyllum virgineus* (Wulfen) P. Kumm., N. Amer. Fl. (New York) 9(6): 386 (1916); *Camarophyllum virgineus* f. *roseipes* (Massee) Borghesi & Fantini, Bollettino del Circolo Micologico "Giovanni Carini" 36: 39 (1999) [1998]; *Camarophyllum virgineus* var. *niveus* (Scop.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 117 (1871); *Cuphophyllum niveus* (Scop.) Bon, Docums Mycol. 14(no. 56): 11 (1985) [1984]; *Cuphophyllum niveus* f. *roseipes* (Massee) Bon, Docums Mycol. 19(no. 76): 73 (1989); *Cuphophyllum subradiatus* (Schumach.) Bon, Docums Mycol. 14(no. 56): 11 (1985) [1984]; *Cuphophyllum virgineus* (Wulfen) Kovalenko, in Nezdořiminogó, Opredelitel' Gribov SSSR (Leningrad): 37 (1989); *Hydrocybe nivea* (Scop.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(6): 377 (1916); *Hygrocybe nivea* (Scop.) P. D. Orton & Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 29(1): 131 (1969); *Hygrocybe subradiata* (Schumach.) P. D. Orton & Watling, Notes R. Bot. Gdn Edinb. 29(1): 131 (1969); *Hygrocybe virginea* (Wulfen) P. D. Orton & Watling, Notes R. Bot. Gdn Edinb. 29(1): 132 (1969); *Hygrophorus niveus* (Scop.) Fr., Epicr. Syst.

Mycol. (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]; *Hygrophorus subradiatus* (Schumach.) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 328 (1838) [1836-1838]; *Hygrophorus virgineus* (Wulfen) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 327 (1838) [1836-1838]; *Hygrophorus virgineus* var. *roseipes* Massee, Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes) (London) 6: 895 (893) (1888); *Omphalia virginea* (Wulfen) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 613 (1821)

***Hygrophorus hondurensis* (Murr.) Murr.**, Mycologia 4: 332 (1912). **Sinonimia:** *Hydrocybe hondurensis* Murr., Mycologia 3: 197. (1911)

***Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) Quél.**, Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 113 (1873) [1872]. **Sinonimia:** *Agaricus sublateritius* Schaeff., Fung. Bavar. Palat. 4: tab. 49, figs 6-7 (1774); *Dryophila sublateritia* (Schaeff.) Quél., Fl. Mycol. France (Paris) (1888); *Geophila sublateritia* (Schaeff.) Quél., Enchir. Fung. (Paris): 113 (1886); *Hypholoma sublateritium* (Schaeff.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 1028 (1887); *Naematoloma sublateritium* (Schaeff.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 495 (1879)

***Inocybe calamistrata* (Fr.) Gillet**, Hyménomycètes (Alençon): 513 (1876). **Sinonimia:** *Agaricus calamistratus* Fries, Syst. Myc. 1: 256. (1821); *Agaricus hirsutus* Lasch, Linnaea 4: 546 (1829); *Inocybe hirsuta* (Lasch) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 178 (1872)

***Lactarius atroviridis* Peck**, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 42: 119 (1889); **Sinonimia:** *Lactifluus atroviridis* (Peck) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 489 (1898)

***Lactarius fragilis* (Burl.) Hesler y A. H. Sm.**, North American Species of Lactarius (Ann Arbor): 503 (1979). **Sinonimia:** *Lactarius camphoratus* subsp. *fragilis* Burl., Mem. Torrey bot. Club 14: 99 (1908)

***Lactarius indigo* (Schwein.) Fr.**, Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 341 (1838) [1836-1838]. **Sinonimia:** *Agaricus indigo* Schwein., Schr. Naturf. Ges. Leipzig 1: 87 (1822)

***Lactocollybia epia* (Berk. y Broome) Pegler**, Kew Bull., Addit. Ser. 12: 77 (1986). **Sinonimia:** *Agaricus epius* Berk. & Broome, J. Linn. Soc., Bot. 11: 517, (1871); *Lactocollybia angiospermamarum* Singer, Sydowia 2(1-6): 32 (1948)

***Leccinum rugosiceps* (Peck) Singer**, Mycologia 37(6): 799 (1945). **Sinonimia:** *Boletus rugosiceps* Peck, Bull. N. Y. State Mus. 94: 20 (1904)

***Lentinula boryana* (Berk. y Mont.) Pegler**, Kavaka 3: 19 (1976) [1975]. **Sinonimia:** *Agaricus boryanus* Berk.

& Mont., Annls Sci. Nat., Bot., Sér. 3 11: 235 (1849); *Agaricus ixodes* Mont., Syll. Gen. Sp. Crypt. (Paris): 105 (1856); *Armillaria boryana* (Berk. & Mont.) Murrill, Bull. Torrey Bot. Club 66: 31 (1939); *Collybia boryana* (Berk. & Mont.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 240 (1887); *Gymnopus boryanus* (Berk. & Mont.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 370 (1916); *Lentinula detonsa* (Fr.) Murrill, Mycologia 3(1): 28 (1911); *Lentinus boryanus* (Berk. & Mont.) Singer, Sydowia 9: 379 (1955); *Lentinus detonsus* Fr., Nova Acta R. Soc. Scient. Upsal., ser. 3 1: 38 (1851); *Lentinus proximus* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 45): 302 (1868) [1869]; *Lentinus puiggarii* Speg.; Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 23(3-4): 387-388 [no. 50, reprint pages 25-26] (1919); *Panus leprieurii* Mont., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4 1: 121 (1854); *Pocillaria detonsa* (Fr.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 866 (1891); *Pocillaria proxima* (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 866 (1891)

***Lepiota clypeolaria* (Bull.) P. Kumm.**, Führ. Pilzk. (Zwickau): 137 (1871). **Sinonimia:** *Agaricus clypeolarius* Bull., Herb. Fr. 9: tab. 405 (1789); *Agaricus colubrinus* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 258 (1801); *Agaricus colubrinus* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 258 (1801) var. *colubrinus*; *Agaricus columbinus* Bull., Herb. Fr. 9: tab. 413; fig. 1 (1789); *Lepiota clypeolaria* var. *minor* J. E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 5 (Taxon. Consp.): V (1940); *Lepiota clypeolaria* var. *ochraceosulfurescens* (Locquin ex Bon) P. Roux & Guy Garcia, Mille et Un Champignons: 978 (2006); *Lepiota colubrina* (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 601 (1821); *Lepiota colubrina* (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 601 (1821) var. *colubrine*; *Lepiota ochraceosulfurescens* (Locq.) Bon, Docums Mycol. 11(no. 43): 33 (1981)

***Lepiota hemisclera* (Berk. y M. A. Curtis) Sacc.**, Syll. Fung. (Abellini) 5: 66 (1887) [1886]. **Sinonimia:** *Agaricus hemisclerus* Berk. & M. A., Curtis J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 45): 283 (1868) [1869]

***Lepista subisabellina* (Murrill) Pegler**, Ciencias Biológicas, Cuba 16: 83 (1971); **Sinonimia:** *Melanoleuca subisabellina* Murrill, Mycologia 3(4): 194 (1911)

***Leucoagaricus rubrotinctus* (Peck) Singer**, Sydowia 2: 36 (1948); **Sinonimia:** *Lepiota rubrotincta* Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. 44: 179 (1891)

***Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Singer**, Sydowia 15(1-6): 67 (1962) [1961]. **Sinonimia:** *Agaricus aureus* (Massee) F. M. Bailey, Compr. Cat. Queensland Pl.: 715 (1913); *Agaricus birnbaumii* Corda, Icon. Fung. (Prague) 3: 48 (1839); *Agaricus cepistipes* sensu Sowerby [Col. Fig.

Engl. Fung. Vol., pl. 2 (1796)] (yellow basidiomes); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005); *Agaricus cepistipes* var. *luteus* Bolton, Hist. Fung. Halifax (Huddersfield) 2: 50 (1788); *Agaricus luteus* With., Arr. Brit. Pl., Edn 3 (London) 4: 233 (1796); *Bolbitius birnbaumii* (Corda) Sacc. & Traverso, Syll. Fung. (Abellini) 19: 151 (1910); *Lepiota aurea* Massee, Bull. Misc. Inf., Kew: 189 (1912); *Lepiota cepistipes* var. *lutea* (Bolton) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 44 (1887); *Lepiota lutea* (Bolton) Matt., Bull. Soc. Mycol. Fr. 13: 33 (1897); *Lepiota pseudolicmophora* Rea, Brit. Basidiomyc. (Cambridge): 74 (1922); *Lepista lutea* (With. ex Secr.) Godfrin, unknown; *Leucocoprinus luteus* (Bolton) Locq., Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 14: 93 (1945)

***Leucocoprinus brunnescens* (Peck) Pegler**, Kew Bull., Addit. Ser. 9: 422 (1983). **Sinonimia:** *Lepiota brunnescens* Peck 1904

***Leucocoprinus cepistipes* (Sowerby) Pat.**, J. Bot., Paris 3: 336 (1889). **Sinonimia:** *Agaricus cepistipes* Sowerby, Col. fig. Engl. Fung. Mushr. 1: pl. 2 (1797) [1795-97]; *Agaricus cheimonoceps* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 45): 283 (1868) [1869]; *Agaricus rorulentus* Panizzi, Comm. Soc. Crittog. Ital. 1(3): 172 (1862); *Coprinus cepistipes* (Sowerby) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 633 (1821); *Coprinus cepistipes* (Sowerby) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 633 (1821) var. *cepistipes*; *Coprinus cepistipes* (Sowerby) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 633 (1821) var. *cepistipes*; *Hiatula cepistipes* (Sowerby) R. Heim & Romagn. [as 'cepaestipes'], Bull. Soc. Mycol. Fr. 50: 181 (1934); *Lepiota cepistipes* (Sowerby) P. Kumm. [as 'cepestipes'], Führ. Pilzk. (Zwickau): 136 (1871); *Lepiota cepistipes* var. *cheimonoceps* (Berk. & M. A. Curtis) Rick, in Rambo (Ed.); Iheringia, Sér. Bot. 8: 314 (1961); *Lepiota cepistipes* var. *rorulenta* (Panizzi) Rick, in Rambo (Ed.); Iheringia, Sér. Bot. 8: 314 (1961); *Lepiota cheimonoceps* (Berk. & M. A. Curtis) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 66 (1887); *Lepiota rorulenta* (Panizzi) Sacc., (1886); *Leucocoprinus cepistipes* var. *rorulentus* (Panizzi) Babos, Annls hist. Nat. Mus. Natn. Hung. 72: 87 (1980)

***Leucocoprinus fragilissimus* (Berk. y M. A. Curtis) Pat.**, Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 171 (1900). **Sinonimia:** *Agaricus flammula* Alb. & Schwein., Conspl. Fung. (Leipzig): 149 (1805); *Agaricus lichenophorus* Berk. & Broome, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 5 12: 370 (1883); *Hiatula fragilissima* Ravenel & Berk., Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 2 12: 422 (1853); *Hiatula lichenophora* (Berk. & Broome) Petch, Ann. Roy. Bot. Gard., Peradeniya 4: 385. (1910); *Lepiota flammula* (Alb. & Schwein.) Gillet, Les Hyménomycètes ou description de tous les champignons (fungi) qui croissent en France (Alençon): 63 (1874); *Lepiota fragilissima* (Ravenel) Morgan, J. Mycol. 13: 5. (1907); *Lepiota lichenophora* (Berk. & Broome) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 44 (1887); *Leuco-*

coprinus lichenophorus (Berk. & Broome) Pat., Bull. Trimest. Soc. mycol. Fr. 29: 216. 1923 (1923)

***Leucopaxillus gracillimus* Singer y A. H. Sm.**, Pap. Mich. Acad. Sci. 28: 131 (1943) [1942]. **Sinonimia:** *Clitocybe rappiana* Murrill, Proc. Fla. Acad. Sci. VII p. 108. (1945) [1944]; *Leucopaxillus gracillimus* Singer & A. H. Sm., Pap. Mich. Acad. Sci. 28: 131 (1943) [1942] var. *gracillimus*; *Leucopaxillus gracillimus* var. *rappii* (Murrill) Singer, Lilloa 22 p. 242 (1951)

***Lichenomphalia alpina* (Britzelm.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo y Vilgalys**, Mycotaxon 83: 36 (2002). **Sinonimia:** *Agaricus alpinus* Britzelm., Ber. Naturw. Augsburg 30: 13 (1890); *Agaricus umbelliferus* f. *flavus* Cooke, Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes) (London) 2: 260 (271) (1883); *Botrydina luteovitellina* (Pilát & Nannf.) Redhead & Kuyper, Arctic Alpine Mycology, II (New York): 333 (1987); *Clitocybe luteovitellina* (Pilát & Nannf.) H. E. Bigelow, Can. J. Bot. 37: 771 (1959); *Gerronema alpinum* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl, in Bresinsky & Haas, Beitr. Z. Pilzk. 1: 161 (1976); *Gerronema luteovitellinum* (Pilát & Nannf.) Singer, Fl. Neotrop., Monogr. 3: 70 (1970); *Omphalia flava* (Cooke) F. H. Møller, Fungi Faeroes 1(1): 260 (1945); *Omphalia luteovitellina* Pilát & Nannf., Friesia 5: 23 (1954); *Omphalia umbellifera* f. *flava* (Cooke) Cejp, Atl. Champ. Europ. 4: 43 (1936); *Omphalia umbellifera* var. *flava* (Cooke) Rea, Brit. Basidiomyc. (Cambridge): 429 (1922); *Omphalina alpina* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl, Z. Pilzk. 40(1-2): 73 (1974); *Omphalina flava* (Cooke) M. Lange, Meddr Grönland, Biosc. 147: 25 (1955); *Omphalina luteovitellina* (Pilát & Nannf.) M. Lange, Meddr Grönland, Biosc. 148(2): 63 (1957); *Phytoconis alpina* (Britzelmayr) Redhead & Kuyper, unknown; *Phytoconis luteovitellina* (Pilát & Nannf.) Redhead & Kuyper, Mycotaxon 31(1): 222 (1988)

***Macrocybe titans* (H. E. Bigelow y Kimbr.) Pegler, Lodge y Nakasone**, Mycologia 90(3): 500 (1998). **Sinonimia:** *Tricholoma titans* H. E. Bigelow & Kimbr., Mycotaxon 11(2): 426 (1980)

***Marasmiellus epochnous* (Berk. y Broome) Singer**, Sydowia 9(1-6): 392 (1955). **Sinonimia:** *Marasmius epochnous* Berk. & M. A. Curtis, Journ. Linn. Soc. p. 41. (1875)

***Marasmiellus merulius* (Bertero) Singer**, Lilloa 22: 296 (1973); **Sinonimia:** *Agaricus merulius* Bertero, in Montagne, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 3: 448 (1835)

***Marasmiellus stenophylloides* (Dennis) Dennis**, Kew Bull., Addit. Ser. 3: 31 (1970). **Sinonimia:** *Crinipellis stenophylloides* Dennis, Trans. Brit. Myc. Soc. 34 p. 429 (1951)

***Marasmiellus troyanus* (Murrill) Dennis**, Kew Bull., Addit. Ser. 3: 31 (1970). **Sinonimia:** *Marasmius troyanus* Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(4) (1915)

***Marasmius berteroii* (Lév.) Murrill**, N. Amer. Fl. (New York) 9(4): 267 (1915). **Sinonimia:** *Heliomyces berteroii* Lév., Annls Sci. Nat., Bot., Sér. 3 2: 177 (1844)

***Marasmius cohaerens* (Alb. y Schwein.) Cooke y Quél.**, Clavis Syn. Hymen. Europ. (1878). **Sinonimia:** *Agaricus balaninus* Berk., Mag. Zool. Bot., 1837 1: 509 (1837); *Agaricus ceratopus* Pers., Mycol. Eur. (Erlanga) 3: 214 (1828); *Agaricus cohaerens* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 306 (1801); *Marasmius ceratopus* (Pers.) Quél., Fl. Mycol. France (Paris): 319 (1888); *Mycena balanina* (Berk.) P. Karst., in Saccardo, Syll. Fung. (Abellini) 5: 252 (1887); *Mycena cohaerens* (Pers.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 275 (1876)

***Marasmius crinis-equi* F. Muell. ex Kalchbr.**, In Grevillea 8: 153 (1880). **Sinonimia:** *Androsaceus crinis-equi* (F. Muell. ex Kalchbr.) Overeem, Heyne, De Nuttige Planten van Nederlanch Indie, 2e Druk, I p. 69 (1927); *Chamaeceras equicrinis* (F. Muell.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 456 (1898); *Chamaeceras trichorhizus* (Speg.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 457 (1898); *Marasmius equicrinis* F. Muell. ex Berk., Grevillea 8(no. 48): 153 (1880); *Marasmius graminum* var. *equicrinis* (F. Muell. ex Berk.) Dennis, Trans. Br. Mycol. Soc. 34: 416 (1951); *Marasmius repens* Henn., Bot. Jb. 23: 548 (1897); *Marasmius trichorhizus* Speg. [as "trichorrhizus"], Fungi Guar. Pug. I n19(1883)

***Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. y Pouzar**, Česká Mykol. 26: 220 (1972). **Sinonimia:** *Agaricus grammocephalus* Bull., Herb. Fr. 13: tab. 594 (1793); *Agaricus platyphyllus* Pers., Observ. Mycol. (Lipsiae) 1: 47 (1796); *Agaricus platyphyllus* Pers., Observ. Mycol. (Lipsiae) 1: 47 (1796) var. *platyphyllus*; *Agaricus platyphyllus* var. *repens* Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 82 (1838) [1836-1838]; *Agaricus repens* Fr., Observ. Mycol. (Havniae) 1: 14 (1815); *Agaricus tenuiceps* Cooke & Massee, Forsch. Pflkr., Tokyo: 398 (1891); *Clitocybula platyphylla* (Pers.) E. Ludw., Pilzkompendium (Eching) 1([2]): 58 (2001); *Clitocybula platyphylla* (Pers.) Malençon & Bertault, Trav. Inst. Sci. Cherifien, Ser. Bot. 33: 398 (1975); *Collybia grammocephala* (Bull.) Quél., Fl. Mycol. France (Paris): 228 (1888); *Collybia platyphylla* (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 117 (1871); *Gymnopus platyphyllus* (Pers.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 367 (1916); *Hydropsus platyphyllus* (Pers.) Kühner, Bull. Mens. Soc. linn. Lyon, Num. Spéc. 49: 895 (1980); *Oudemansiella platyphylla* (Pers.) M.M. Moser, in Gams, Kleine Kryptogamenflora, Rev. Edn 5 (Stuttgart) 2b/2: 156 (1983); *Tricholoma tenuiceps* (Cooke & Massee) Massee, Syll. Fung. (Abellini) 20:

1011 (1911); *Tricholomopsis platyphylla* (Pers.) Singer, Schweiz. Z. Pilzk. 17: 13 (1939)

***Melanotus cassiaeicolor* (Berk.) Singer**, Sydowia 6(5-6): 348 (1952). **Sinonimia:** *Crepidotus cassiaeicolor* (Berk.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 882 (1887)

***Micromphale brevipes* (Berk. & Ravenel) Singer**, Kew Bull. 8(1): 42 (1953). **Sinonimia:** *Marasmius brevipes* Berk. & Ravenel, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 2 12: 426 ['326'] (1853)

***Mycena alcalina* (Fr.) P. Kumm.**, Führ. Pilzk. (Zwickau): 109 (1871). **Sinonimia:** *Agaricus alcalinus* Fr., Observ. Mycol. (Havniae) 2: 153 (1818)

***Mycena alphitophora* (Berk.) Sacc.**, Syll. Fung. (Abellini) 5: 290 (1887). **Sinonimia:** *Agaricus alphitophorus* Berk., J. Linn. Soc., London 14: no. 40 (1875); *Mycena osmundicola* J. E. Lange, Dansk Bot. Ark. 1(no. 5): 35 (1914); *Mycena osmundicola* subsp. *imleriana* Kühner, Encyclop. Mycol. 10: 210 (1938); *Mycena osmundicola* var. *imleriana* (Kühner) A. Pearson, Trans. Br. mycol. Soc. 35(1): 100 (1952); *Prunulus alphitophorus* (Berk.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 339 (1916)

***Mycena holoporphyrta* (Berk. y M. A. Curtis) Singer**, Sydowia 15(1-6): 64 (1962) [1961]. **Sinonimia:** *Agaricus holoporphyrus* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 45): 284 (1868) [1869]

***Mycena parabolica* (Fr.) Quél.**, Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 242 (1872). **Sinonimia:** *Agaricus parabolicus* Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 107 (1838) [1836-1838]; *Mycena galericulata* var. *parabolica* (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 111 (1871)

***Mycena sanguinolenta* (Alb. y Schwein.) P. Kumm.**, Führ. Pilzk. (Zwickau): 108 (1871). **Sinonimia:** *Agaricus cruentus* Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 149 (1821); *Agaricus sanguinolentus* Alb. & Schwein., Conspl. Fung. (Leipzig): 196 (1805); *Agaricus sanguinolentus* var. *cruentus* (Fr.) Pers., Mycol. Eur. (Erlanga) 3: 244 (1828); *Galactopus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 319 (1916); *Mycena cruenta* (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 107 (1872); *Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 108 (1871) f. *sanguinolenta*; *Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 108 (1871) var. *sanguinolenta*

***Mycena stylobates* (Pers.) P. Kumm.**, Führ. Pilzk. (Zwickau): 108 (1871). **Sinonimia:** *Agaricus dilatatus* Fr.,

Observ. Mycol. (Havniae) 1: 40 (1815); *Agaricus dilatatus* Fr., Observ. Mycol. (Havniae) 1: 40 (1815) var. *dilatatus*; *Agaricus stylobates* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 390 (1801); *Agaricus stylobates* var. *dilatatus* (Fr.) Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 154 (1821); *Agaricus stylobates* Pers., Syn. Meth. Fung. (Göttingen) 2: 390 (1801) var. *stylobates*; *Agaricus torquatus* Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 153 (1821); *Basidopus stylobates* (Pers.) Earle, Bull. N. Y. Bot. Gard. 5: 426 (1909) [1906]; *Chamaeceras torquatus* (Fr.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 457 (1898); *Marsmius torquatus* (Fr.) Massee, Eur. Fung. Flora: 60 (1902); *Mycena dilatata* (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 261 (1876); *Mycena torquata* (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau) (1871); *Pseudomycena stylobates* (Pers.) Cejp, Publ. Fac. Sci. Univ. Charles 104: 150 (1930)

Panaeolus subbalteatus (Berk. y Broome) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 1124 (1887). **Sinonimia:** *Agaricus subbalteatus* Berk. & Broome, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 3 7: 378 (1861)

Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys y Hopple, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 235 (2001). **Sinonimia:** *Agaricus plicatilis* Curtis, Fl. Londin. 5: 57 (1787); *Coprinus plicatilis* (Curtis) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 252 (1838) [1836-1838]; *Parasola plicatilis* (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, Taxon 50(1): 235 (2001) var. *plicatilis*

Phlebopus beniensis (Singer y Digilio) Heinem. y Rammeloo, Mycotaxon 15: 390 (1982). **Sinonimia:** *Phaeoglyroporus beniensis* Singer & Digilio, Lilloa 30 p. 150 (1960)

Psilocybe phyllogena (Peck) Peck, Bull. N.Y. St. Mus. 157: 99 (1912) [1911]. **Sinonimia:** *Agaricus phyllogenius* Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. Nat. Hist. 26: 60 (1874) [1873]; *Agaricus rhombisporus* Britzelm., Bot. Zbl. 54(15-17): 18 (1893); *Deconica rhombispora* (Britzelm.) Singer, Lilloa 22: 509 (1951) [1949]; *Geophila rhombispora* (Britzelm.) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 338 (1953); *Psilocybe phyllogena* (Peck) Peck, Bull. N.Y. St. Mus. 157: 99 (1912) var. *phyllogena*; *Psilocybe rhombispora* (Britzelm.) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 11: 72 (1895)

Pulveroboletus ravenelii (Berk. & M. A. Curtis) Murrill, Mycologia 1(1): 9 (1909). **Sinonimia:** *Boletus ravenelii* Berk. & M. A. Curtis, Cent. N. Am. Fungi n 38 et N. Am. Fungi n 111 (1853)

Resinomyces saccharifera (Berk. y Broome) Redhead, Can. J. Bot. 62(9): 1850 (1984). **Sinonimia:** *Agaricus electicus* Buckn., Proc. Bristol Nat. Soc., Ser. 3 3(2): 132 (1881); *Agaricus sacchariferus* Berk. & Broome, Ann. Mag.

Nat. Hist., Ser. 4 6: 465 (1870); *Delicatula quisquiliaris* (Joss.) Kühner & Romagn., Docums Mycol. 13(no. 49): 38 (1983); *Marasmiellus ornatissimus* Noordel. & Barkman, in Noordeloos, Persoonia 13(3): 254 (1987); *Mycena kalalochensis* A. H. Sm., North Amer. Species of Mycena: 99 (1947); *Mycena pudica* Hora, Trans. Br. Mycol. Soc. 43(2): 452 (1960); *Mycena quisquiliaris* (Joss.) Kühner, Encyclop. Mycol.: 388 (1938); *Mycena saccharifera* (Berk. & Broome) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 262 (1876); *Mycena saccharifera* var. *electica* (Buckn.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 3: 82 (1893); *Omphalia quisquiliaris* Joss., Bull. Soc. linn. Lyon 80: 88 (1937) [1936]; *Pseudomycena saccharifera* (Berk. & Broome) Cejp, Publ. Fac. Sci. Univ. Charles 104: 147 (1930); *Resinomyces kalalochensis* (A. H. Sm.) Redhead & Singer, Mycotaxon 13(1): 156 (1981); *Resinomyces saccharifera* subsp. *kalalochensis* (A. H. Sm.) Redhead, Can. J. Bot. 62(9): 1850 (1984); *Resinomyces saccharifera* (Berk. & Broome) Redhead, Can. J. Bot. 62(9): 1850 (1984) subsp. *Saccharifera*

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer, Persoonia 2(1): 48 (1961). **Sinonimia:** *Agaricus rhacodium* Berk. & M. A. Curtis, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 3 4(22): 288 (1859); *Agaricus trichotis* Pers., Mycol. Eur. (Erlanga) 3: 18 (1828); *Dendrosarcus rhacodium* (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3: 464 (1898); *Geopetalum rhacodium* (Berk. & M. A. Curtis) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 68 (1953); *Pleurotus applicatus* f. *rhacodium* (Berk. & M. A. Curtis) Pilát, Atlas Champ. I'Europe, II: *Pleurotus* Fries (Praha): 67 (1935); *Pleurotus rhacodium* (Berk. & M. A. Curtis) Sacc., Syll. Fung. (Abellini) 5: 380 (1887); *Resupinatus applicatus* var. *trichotis* (Pers.) Krieglst., Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 8: 177 (1992); *Resupinatus rhacodium* (Berk. & M. A. Curtis) Singer, Lilloa 22: 253 (1951) [1949]

Rhodocollybia popayanica (Halling) Halling, in Antonín, Halling & Noordeloos, Mycotaxon 63: 365 (1997). **Sinonimia:** *Collybia popayanica* Halling, Mycologia 81(6): 872 (1990) [1989]

Rhodocollybia turpis (Halling) Halling, in Antonín, Halling & Noordeloos, Mycotaxon 63: 366 (1997). **Sinonimia:** *Collybia turpis* Halling, Mycologia 81(6): 870 (1990) [1989]

Russula virescens (Schaeff.) Fr., Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.: 50 (1836). **Sinonimia:** *Agaricus virescens* Schaeff., Fung. Bavar. Palat. 4: 40 (1774)

Skepperiella spathularia (Berk. y M. A. Curtis) Pilát Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 43: 56 (1927). **Sinonimia:** *Craterellus spathularius* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 46): 328 (1868); *Rimbachia spathularia* (Berk. & M. A. Curtis) Singer, Lilloa 22: 741 (1951); *Skepperia spathularia* (Berk. & M. A. Curtis) Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. 15: 194 (1899);

Trombetta spathularia (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 2: 873 (1891)

Tetrapyrgos alba (Berk. y M. A. Curtis) E. Horak, Sydowia 39: 101 (1987) [1986]. **Sinonimia:** *Campanella alba* (Berk. & M. A. Curtis) Singer, Lloydia 8: 191 (1945); *Favolaschia alba* (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze, Revis. Gen. Pl. (Leipzig) 3(2): 476 (1898); *Laschia alba* Berk. & M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 46): 323 (1868); *Pterospora alba* (Berk. & M. A. Curtis) E. Horak, Sydowia 36: 129 (1983)

Tetrapyrgos reducta (Singer) E. Horak, Sydowia 39: 102 (1987) [1986]. **Sinonimia:** *Marasmiellus reductus* Singer,

Lilloa 22: 331 (1973); *Pterospora reducta* (Singer) E. Horak, Sydowia 36: 134 (1983)

Tylopilus umbrosus (G.F. Atk.) A.H. Sm. y Thiers, Mycologia 60(4): 950 (1968). **Sinonimia:** *Boletus umbrosus* G.F. Atk., Journ. of Mycol. p. 112 (1902)

Xanthoconium separans (Peck) Halling y Both, Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci. 36: 240 (1998). **Sinonimia:** *Boletus edulis* f. *separans* (Peck) Vassilkov, Belyi Grib (White Mushrooms); p.: 15 (1966); *Boletus edulis* subsp. *separans* (Peck) Singer, Am. Midl. Nat. 37: 26 (1947); *Boletus reticulatus* subsp. *separans* (Peck) Hlaváček, Mykologický Sborník 71(2): 52 (1994); *Boletus separans* Peck, Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci. (1873)