

OBJETIVOS: en un grupo de individuos que ingresaron por intento de suicidio a los servicios de urgencias de diferentes centros asistenciales de la ciudad de Medellín, se describen las características de aquellos clasificados en la evaluación clínica psiquiátrica como de alto o bajo riesgo de reincidencia.

MÉTODOS: es un estudio de corte transversal. Se hizo entrevista psiquiátrica a 238 individuos con intento de suicidio reciente para clasificarlos en dos grupos, de alto o bajo riesgo de reincidencia, y se aplicó el instrumento de autorreporte "Inventario de Razones para Vivir" (RFL). Posteriormente, se compararon las características de ambos grupos.

RESULTADOS: el 60,5% de los participantes se consideraron de alto riesgo de suicidio y los factores que se encontraron asociados fueron: trastorno depresivo mayor (OR = 5,78; IC 95%: 3,01-11,2), método violento (OR = 5,21; IC 95%: 1,89-14,37), intoxicación por sustancias psicoactivas durante el intento (OR = 2,46; IC 95%: 1,07-5,64) y puntaje bajo en el "Inventario de Razones para Vivir" (OR = 0,47; IC 95%: 0,34-0,66)

CONCLUSIONES: aunque los resultados no son generalizables, son similares a los encontrados en otros lugares. Es necesario hacer estudios longitudinales que permitan determinar la utilidad de estas características para predecir conductas suicidas.

PALABRAS CLAVE: Evaluación de riesgo, Factores de riesgo, Intento de suicidio.

12. Eficacia de la angiotomografía con multidetectores en el diagnóstico del trauma arterial de las extremidades. Informe parcial

Tatiana Suárez Poveda¹, Carlos Hernando Morales Uribe²
Martín Ochoa Escudero³

OBJETIVO: determinar la eficacia de la angiotomografía con multidetectores en el diagnóstico del trauma arterial de las extremidades.

.....
¹ Profesora de Radiología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.
² Profesor de Cirugía General, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.
³ Residente de Radiología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.

MATERIALES Y MÉTODOS: durante 32 meses, 68 extremidades de 65 pacientes con sospecha de lesión vascular traumática fueron evaluadas por medio de angiotomografía con multidetectores. El radiólogo de turno interpretó los estudios y sus hallazgos se compararon con los de la cirugía, arteriografía o seguimiento (clínico o telefónico).

RESULTADOS: para el diagnóstico de lesión arterial de las extremidades, la angiotomografía con multidetectores demostró sensibilidad de 91,3% (IC 95%: 77,6-100%), especificidad: 94,6% (IC 95%: 86,0-100%), índice de validez: 93,3% (IC 95%: 86,2-100%), valor predictivo positivo de 91,3% (IC 95%: 77,6-100%), valor predictivo negativo de 94,6% (IC 95%: 86,0-100%) y razón de probabilidad de 16,89.

CONCLUSIÓN: la angiotomografía con multidetectores es un método de imagen confiable para el diagnóstico del trauma arterial de las extremidades.

PALABRAS CLAVE: Adelgazamiento arterial, Angiotomografía con multidetectores, Fístula arteriovenosa, Oclusión vascular, Pseudoaneurisma, Trauma arterial de las extremidades.

13. Chelating capacity and the adverse effects of two treatments (N-acetylcysteine and D-penicillamine) in patients with mercury poisoning in Segovia, a municipality at the northeastern part of Antioquia, Colombia

Claudia Lucía Arroyave, Carlos Federico Molina Castaño,
Ana María Suárez, Natalia Maldonado, Fanny Cuesta González

OBJECTIVE: to compare the chelating capacity and the adverse effects of treatments with either N-acetylcysteine or D-penicillamine in patients with mercury poisoning in Segovia, a municipality at the northeastern part of Antioquia, Colombia.

METHODS: 50 patients with toxic levels of mercury were enrolled in a 10 days open label, randomized compa-

.....
Departament of Pharmacology and Toxicology, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Telefax: (574) 210 60 20. fannycuesta@quimbaya.udea.edu.co