



Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Questions and answers

Fernando Raffán-Sanabria ^{a,b}

^a Anestesiólogo intensivista, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia

^b Profesor, Universidad del Bosque y Universidad de los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

1. En la investigación de Tafur-Betancourt LA, Arévalo-Sánchez M y Lema-Flórez E, sobre la frecuencia de tos al momento de la extubación con remifentanil se encontró que la mejor respuesta se obtuvo con niveles plasmáticos entre:
 - a) 1-2 ng/ml.
 - b) 2-3 ng/ml.
 - c) 3-4 ng/ml.
 - d) 4-5 ng/ml.
2. Al comparar la efectividad de morfina vs. fentanil vía IV en el dolor severo POP, a dosis equipotentes, en intervalos de 5 min, tiempo que se considera clínicamente relevante para la reducción del dolor severo en analgesia postoperatoria Cadavid-Puentes A et al., encontraron que:
 - a) No hubo diferencia significativa en la eficacia para el rescate en dolor severo entre los 2 medicamentos.
 - b) Hubo más incidencia estadísticamente significativa de náusea y vómito con la morfina que con el fentanil.
 - c) Hubo mayor diferencia estadísticamente significativa de casos de depresión respiratoria con fentanil que con morfina.
 - d) Hubo mayor diferencia estadísticamente significativa de prurito con morfina que con fentanil.
3. En la investigación realizada por Tamariz-Cruz OJ et al. sobre los efectos de la tromboelastografía en pacientes pediátricos sometidos a circulación extracorpórea mayor de 90 min se observó una alteración estadísticamente significativa en:
 - a) Tiempo R.
 - b) Ángulo alfa.
4. En el escenario de la analgesia obstétrica ¿cuál de las siguientes técnicas ha sido reportada en la literatura con la mayor frecuencia de complicaciones?:
 - a) Peridural.
 - b) Bloqueo pudendo.
 - c) Combinada epidural-espinal.
 - d) Opiáceos iv.
5. La hemorragia posparto (HPP) es la causa de una de cada 4 muertes maternas. De las siguientes afirmaciones ¿cuál es la correcta respecto a definición de muerte materna? La que se presenta:
 - a) Durante el parto.
 - b) Durante la gestación.
 - c) Hasta 42 días después del nacimiento.
 - d) Todas las anteriores.
6. En relación con la cefalea pospuñeción de la dura madre en la paciente obstétrica es cierto que:
 - a) Se resuelve espontáneamente en el 40% de los casos.
 - b) El uso de hormona adrenocorticotrópica ha demostrado recientemente ser tan efectivo como el parche epidural.
 - c) El bloqueo esfenopalatino transnasal utilizado en la neuralgia del nervio trigémino se ha descrito como una alternativa para su manejo.
 - d) Todas son ciertas.

7. Con relación a la técnica de reanimación cardiopulmonar, es cierto que:
- Si ésta es realizada por personal entrenado, la supervivencia se encuentra entre el 7 y el 24% de los casos reportados.
 - Se recomienda que los médicos, en general se capaciten cada 2 años.
 - La técnica de alta calidad incluye el logro de una completa expansión del tórax entre compresiones.
 - Todas son ciertas.
8. ¿Cuántas compresiones, como mínimo se deben realizar en un minuto de reanimación cardiopulmonar?
- 100.
 - 90.
 - 80.
 - 120.
9. Posteriormente a la descarga del DEA usted debería:
- Esperar 5 s por si la descarga eléctrica lo puede afectar al tocar al paciente.
 - Dar compresiones torácicas inmediatamente.
 - Verificar el pulso del paciente.
 - Esperar a que el DEA vuelva a analizar el ritmo cardíaco.
10. Los criterios postulados por Sir Austin Bradford Hill para establecer una relación causal incluyen todo lo siguiente excepto:
- Fuerza de asociación.
 - Evidencia experimental.
 - Temporalidad.
 - Sensibilidad.

Referencia

Raffán F. Preguntas y respuestas. Rev Colomb Anestesiol. 2017;45:1-154.

Respuestas

- c.
- a.
- b.
- c.
- d.
- c.
- d.
- a.
- b.
- d.