

Resúmenes del Congreso

Características del consumo de sustancias recreativas en establecimientos nocturnos del Valle de Aburra 2009

Characteristics of consumption of recreational substances in nocturnal establishments from Valle de Aburra 2009

Cristian Camilo Benítez Restrepo¹, Gloria Inés Martínez Domínguez¹, Lina María Martínez Sánchez¹, María de los Angeles Rodríguez Gazquez¹, Diana Marcela Castrillón Velilla¹, Catalina Franco Rúa¹, Sergio Augusto Mira Uribe¹

RESUMEN

Introducción: En años recientes han surgido las denominadas “drogas recreativas”, las cuales se asocian a un contexto de entretenimiento nocturno como el de las discotecas y los bares, al igual que a la presencia simultánea de ciertos tipos de música; adicional al progresivo aumento del consumo, también se ha incrementado el número de reportes sobre los efectos adversos relacionadas con estas sustancias. **Objetivo:** Identificar las características demográficas y de consumo de sustancias recreativas de las personas que acuden a establecimientos nocturnos de algunos municipios del Valle de Aburra.

Metodología: Estudio cross-sectional, la población estuvo compuesta por personas de ambos sexos y mayores de edad que frecuentan establecimientos nocturnos en el Valle de Aburra. Se aplicó el cuestionario SONAR 98 modificado y adaptado por los investigadores. **Resultados:** Se realizó en 17 centros nocturnos, participaron 789 personas, 57,7% eran mujeres, la edad promedio 23 años; con alguna actividad laboral (39,0%) y estudiantes (61,0%); la frecuencia para el estrato socioeconómico 4 fue (31,0%), para el 3 (30,0%) y el 5 (22,0%). La mayoría de los encuestados habían consumido alguna vez en su vida alcohol (95%), cigarrillo (46,0%), cannabis (25,0%), nitrito de amilo “Popper”(10,0%), “drogas de diseño” como anfetaminas y metanfetaminas (9,0%), y sedantes e hipnóticos (10,0%). El primer consumo, se inició de manera temprana con las llamadas drogas sociales: alcohol (14 años), y tabaco (15 años). **Conclusiones:** A diferencia de los resultados obtenidos a nivel mundial, este estudio mostró que el consumo de drogas recreativas se inicia con sustancias socialmente aceptadas, como el alcohol y el tabaco, mientras que las drogas de diseño y otras tienen un uso más restringido, y su consumo se ve relegado a edades más tardías.

Salud UIS 2011; 43(1): 72-73

Palabras clave: Agentes psicoactivos, consumo, esparcimiento

1. Semillero de Investigación Facultad de Medicina, SIFAM, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.

Correspondencia: Lina María Martínez Sánchez, Bacterióloga, Esp. En Hematología, Coordinadora Semillero de Investigación Facultad de Medicina, Universidad Pontificia Bolivariana, Calle 78 B No 72 a 109, Medellín, Colombia, Teléfono: 4936300 Ext.:854, E mail: linam.martinez@upb.edu.co

Recibido: 1 de mayo de 2010 - **Aceptado:** 30 de junio de 2010

Resúmenes del Congreso

ABSTRACT

Introduction: In recent years there have come into existence the so-called “recreational drugs” which are related to a night entertainment context such as discotheques and bars, as well as the simultaneous presence of certain types of music; besides the increasing consumption, the number of reports about adverse effects related to its consumption has also increased. **Objective:** To identify the demographic and “recreational substances” consumption characteristics of people attending night clubs in some of the municipalities of the Aburrá Valley. **Methods:** We designed a cross-sectional study. The population was made-up of adult males and females that attended night clubs in the Aburrá Valley. We used the SONAR 98 modified survey adapted to the researchers. **Results:** We studied 17 night clubs, 789 people participated, 57.7% were female, mean age was 23 years; with some labor activity (39%) and students (61%); the frequency for socioeconomic stratum 4 was (31%), 3 was (30%) and 5 (22%). Most of the surveyed population had consumed at some point of their lives alcohol (95%), cigarette (46%), cannabis (25%), amyl nitrite or “Popper” (10%), “designed drugs” such as amphetamines and methamphetamines (9%), sedatives and hypnotics (10%). Consumption first started early in life with the so-called social drugs: alcohol (14 years of age), and cigarette smoking (15 years of age). **Conclusions:** Unlike results shown worldwide, our study showed that recreational drugs consumption started with socially accepted substances such as alcohol and cigarette smoking, whereas designed drugs and other drugs have a more restricted use, and its consumption is left for older ages. *Salud UIS 2011; 43(1): 72-73*

Keyword: Psychoactive agents, consumption, party

Configuración y características de las redes de servicios de salud en Colombia

Configuration and characteristics of health service networks in Colombia

Natalia Morales¹, Amparo Mogollón¹, Virginia García¹, Luis Fernando Rodríguez¹, Ana María Barragán¹, Sandra Liliana López¹, Sandra Carolina Valencia¹, Mónica Pinilla¹, Ingrid Vargas², Jean Pierre Unger³, Pierre de Paepe³, Rejane María Ferreira^{4,5}, María Luisa Vázquez².

1. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario Bogotá, Colombia.

2. Consorcio de Salud y Social de Cataluña, España.

3. Instituto de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo, ITM , Bélgica.

4. Fundacao Universidade de Pernambuco, UPE.

5. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhaes, FIOCRUZ, Recife (Brasil)

Correspondencia: Amparo Mogollón. Fisioterapeuta, PhD. Salud Pública. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario Bogotá, Colombia. E-mail: amparo.mogollon@urosario.edu.co Carrera 24 N° 63C-69, Bogotá, Colombia, teléfono: 3474570 Extensión: 394

Recibido: 1 de mayo de 2010 - **Aceptado:** 30 de junio de 2010